
Tractatus, (cui Titulus, *Processus
Integri in Morbis terè Omnibus
Curandis*) à Clarissimo D. D.
Thomà Sydenham Conscriptus
Imprimatur.

Thomas Burwell, Præses.

Humphrey Brook,

Jos. Clerk,

Gulielmus Briggs,

Fredr. Slare,

} Censores.

Datum 18^o. Die Augusti
A.D. 1673. in Comi-
tū Censoris ex Ædi-
bus Collegii nostri.

Tractatus, (cui Titulus, *Processus
Integri in Morbis terè Omnibus
Curandis*) à Clarissimo D. D.
Thomà Sydenham Conscriptus
Imprimatur.

Thomas Burwell, Præses.

Humphrey Brook,

Jos. Clerk,

Gulielmus Briggs,

Fredr. Slare,

} Censores.

Datum 18^o. Die Augusti
A.D. 1673. in Comi-
tū Censoris ex Edi-
bus Collegii nostri.

Crynes
Processus Integri 190.

I N
M O R B I S

Ferè Omnibus

C U R A N D I S,

A. D^o. *Thoma Sydenham* M. D.

Conscripti,

Quibus accessit graphica Sym-
ptomatum delineatio, una cum
quamplurimis Observatu dignis.

N E C N O N

De *Phthisi* Tractatulo

Nunquam antehac Editio.

L O N D I N I :

Impensis *Sam. Smith & Benj. Walford*,
ad Insignia Principis, & *J. Knapton*, ad
Insigne Coronæ in Cœmeterio
D. Pauli. 1695.

1700

Processus Integri

IN

MORBUS

Febris Continua

CURANDIS

A. D. Thomas Sydenham M.D.

Conscripsit

Quibus accessit graphica Symptomatum delineatio, una cum
pseudoplasmodii Observationibus.

NEC NON

De Plethorae Tractulo

Nundum antea Editio.

LONDINI:

Impensis Sam. Smith & Benj. Walford,
ad insignia Principis & Regis, et
insigne Coronae in Commercio
D. Pauli, 1692.

Amice Lector,

Specimen habes Praxeos eximiae, in dilectissimi filii M. D. usum, cautè & diligenter excogitatum, suâ ipsius manu conscriptum, mihi autem pro familiaritatè ista quâ omnes excepit, concessum à Cl. Sydenham, Viro sanè cui vix ætas superior parem dederat, vel postera datura est, non modo in arte sua mirâ sagacitate, & ingenii acumine singulari, conspicio: sed & probis moribus, & in humanum genus, studio & amore insignibus adeo, ut apud omnes summum sui reliquerit desiderium: Cujus præcepta sicet animo meo & imo pectore infixæ sint, ne tamen fortè sortiturâ in mei ipsius & ægrorum detrimentum excidant memoriâ parùm fidâ, typis haud ita pridem mandabam, exemplaribus circiter viginti impressis, ut amicis quoq; inservirem. Nescio autem quo pacto in lucem irrepsit publicam inter *Miscellanea Curiosa* superioris anni Norimbergæ editum; sed ineptâ mole inutile. Prodiit tandem eo modo vestitum ut tibi sit in quovis loco paratum; figmentis cerebri vanis & futilibus sciolorum dogmatibus nequaquam refertum, nec hypothesi placidâ solidis

ut videtur rationum momentis unde quaque
constipatâ superbiens ; humile autem & mo-
destum accuratè morbos depingit, & accura-
tiùs adhuc medetur ; in id solum sollicitum
ut innotescat quod natura faciat aut ferat.
Et si verum loqui liceat, modo partium situs
noveris, pateant tibi per Symptomata ægri-
tudines, (quod assiduâ ediscas observatione)
scias deinde veram & genuinam medendi
methodum, per dietam & Pharmaciam adhi-
bere, sælicissimus eris practicus, & tibi & in-
firmis optimè consules. Parùm interim tuâ
refert utrum Alkali peccet an Acidum, num
in Spiritibus Animalibus, an in ipso sanguine,
aut in recondito aliquo Viscere delitescat
morbi minera ; unde de Periodico Intermit-
tentium reditu doctè satis & prolixè possis
differere ; dum interea ipsa Febris sine ullis
ambagibus, inquietudine, siti, calore, pulsu
celeri, nausæâ, cæterisque Symptomatis etiam
astantibus palam est, & apertè dignoscitur :
Hinc sæpius mirari subit, quam obrem anxie
ita & scrupulosè immediatas & proximas
morborum causas, dum Medicinam pertra-
ctandam suscipiunt, indagare sagunt, & de
tenebris istis, quibus natura obduxit, irritò
licet conatu, eruere, gravi & subactò
iudicio viri, & in praxi versatissimi ; satis in-
terim gnari se latere vel quævis obvia ; unde
enim dimanat graminis viridis, aut albus ni-
vis color ? Quid est quod humana anima ra-
ticipinari

tiocinari nequeat dum adhuc Infantes aut Pue-
ri sumus ? Unde forma tua Specifica ? Sati-
us esset Medicum quam Philosophum agere, (quis
enim unquam Cartesium sibi Medicum vo-
luerit) minutissima Phænomena planè & ritè
enumerare, & remedia quibus unusquisque
morbus facilius cedat, candido & sincero ani-
mo proponere; ita tandem limites suos præter-
gressa, quibus angustis, nimis jam includitur
ars nobilissima, omnibus, quaquaversum pa-
ter orbis, sæliciter satis & prosperè salutem,
filiis autem suis honores summos conciliabit.

Meditabatur paulo ante obitum tractatum
de Phthisi peritissimus medicus; in perqui-
rendo, naturæ methodum, qua morbos amo-
liri studet, ut adjutrices porrigeret manus, &
miseriis hominum subveniret, diu noctuque
pensitabundo, & anxio animo, exercitatissi-
mus; hinc fidissimarum observationum serie
& irrefragabili edoctus experientiâ medicinæ
praxin ornavit, & ad saniores reduxit regu-
las; sed væ tabidis, dum hujusmodi nun-
quam intermissis studiis detenti & defatigati
spiritus, solitis non vacabant excubiis, trucu-
lentissimus hostis, *Podagra*, quæ per multos
annos obsederat, & debilitaverat artus, impe-
tu facto in interiora viscera irruit, per vom-
itum & secessum enormiores intentans mortem,
unico autem morbo nescit cedere Medicorum
Princeps, sed cum malorum cumulo accessit
& *Renum Calculus*, qui corrasis vasorum of-
culis,

culis, sanguinem liberalius, quam senectus
tulit, urinæ permixtum effudit, se jam non
amplius opponens, nec vitæ, nec mortis cupi-
dus, placidam, & pacatam, expiravit ani-
mam. Ne tamen auxilio prorsus destituan-
tur tabidi fragmenta quædam quæ au-
torem ubivis sapiunt in primo saltem
morbi stadio plerumque proficua, (neq; enim
fas est, quod ægrotanti proximo opitulerur,
celare,) in publicum prodeunt, ut exinde pa-
teat quam acutara, & omnibus numeris ab-
soluta, si modo Deus Opt. Maximus concessis-
set vitam, expectari potuisset Phthisiologia.

Quid in Febribus, Variolis, Morbillis, acutis
cæteris, ut & Chronicis sanandis valuit
optimè meritis autor noster, sequentes indi-
cant paginæ. Regimen & Diæta institun-
tur apulsiſſima; præscribuntur remedia pau-
ca, sed neceſſaria; nec in Pharmacopolarum
lucrum excogitata, nec inani ostentationi com-
posita: sitibundis ægris (eodem modo quo
& ipse sitim suam reſtinguere ſolitus erat)
cereviſſam tenuem affatim & pro libitu hau-
riendam, unde mirè reficiuntur & refrige-
rantur, concedit; nec immanitate plus quàm
barbarâ, precibus eorum ſurdus, Apozemata
& Julapia præ ingrato ſapore faſtidita ſub-
ſtituit; maximam adhibet cautelam ne ex-
æſtuans nimis, vel igne luculentiori, vel ſtra-
gulorum onere, plus adhuc incaleſceret, vel
à propinatis forſan remediis eum in finem ut

per poros eliminetur materia morbifica cruda
adhuc & inconcocta, quæ tamen hæc datâ
ansâ concitato motu cerebrum petit, unde
Phrenesis aut Coma, aut extravasato san-
guine deturpant cutim maculæ purpureæ,
aut eruptiones quas vocant miliares collum
& pectus ubivis obsident. Nunquid ad a-
muissim magis depingi poterat quam Vario-
larum historia? eruptionis diem in utraque
specie designat. pustularum ingenium ad un-
guem describit, quo tempore incipiat, &
quamdiu continuetur Salivatio, quo iterum
faciei manuumque tumor se prodât, quid
tandem quolibet die expectandum disertè
explicat. Paregoricorum usum, quo emo-
lumento judicent Practici, primus persuasit,
malum, ingerendi Cardiaca ante eruptionem,
morem, unde sæpe accersitum fuerit conflu-
entium genus, meritò primus improbavit.
Meliùs autem hæc ex ipso fonte. Valeas
itaq; amice Lector, & sicubi scateant Mendæ
ignoscas.

S. M.

Amico

Amico suo Integerrimo M. D.
Expertissimo Domino S. M.

*S*olum sequaces præbulimus diu
Cum Medentes; Compar habebitur
Qui clariorem te, minori
Reddidit hoc, Medicina! Libro.

Non hic tument Mole superbiens
Blattis futurus Præda opulentior:
Sensu sed arcta Ditioni
Conciliant sibi Verba Pondus.

Frustra molesto vasta Volumine
Lustres Galeni scripta; Minutule
Acumen huic majus Tabellæ;
Se stupet hic Medicina totam.

Hic non remoto sordidus Angulo
Sensim fatiscet; Sedula strenuè
Manus quotannis, Spe perenni
Deteret, auctior ut resurgat.

Applaudè Votis Turba Medentium:
Non Febris illum, Morbus atrocior
Haud afflet ullus; Commodis qui
Immoritur satagendo Vestris.

Sic Vovet,

Christophorus Crelle, M. D.

I N D E X.

A		Febre Constitutio-
D e Abortu Præ-		num variarum, 16
cavendo P. 64		Febribus à dentitione
Ambustis 87		ortis 82
Angina 30		Febre depuratoria, 12
Apoplexia 46		Febre Erysipelatosa,
Atthmate 92		28.
C		Febre Hæctica Infan-
Canis rabidi morsu,		tum 82.
90		Febre Intermitt. 16
Chlorosi 84		Febre Pestilentiali, 14
Cholera Morbo 56		Febre Scarlatina, 22
Chorea sancti viti, 44		Fluore albo 76
Colica biliosa 55		Furor sive Porri-
Colica Hysterica, 61		gine capitis 90
Colica Pictonum, 38		G
Contusionibus 89		
D		Gonorrhœa virulen-
Diabete 77		ta 70
Diarrhœa 51		H
Dysenteria ibid.		
E		Hæmoptœ 85
Epilepsia Puerorum,		Hæmorrhagia nari-
79		um O 83
F		Hæmorrhoidum do-
Febre Stationaria, 19		lore 78
		Hæmorrhoidum flu-
		xu immodico, 79
		Hy-

Hydrope 66

Hypochondriaca af-
fectione 5

Hysterica Passione,
ibid.

Ictero 63

Iliaca Passione 58

L

Lochiorum fluxu im-
modico 64

Lochiorum suppressi-
one 65

Lue Venerea 74

M

Mania communi, 88

Mensium fluxu im-
modico 60

Mensium suppressi-
one 85

Mictu, Sanguineo à
Renum calculo, 50

Morbillis 32

N

Nephritico Paroxys-
mo 49

O

Ophthalmia 48

P

Paralyfi 93

Peripneumonia
tha, 25

Phthifi 93, 98

Pleuritide A 23

Prunhu ferino A 36

Punctura tendinis, 87

Podagra 102

R

Rachitide 80

Rheumatismo 26

Remediorum formu-
lae

S

Scorbuto 96

T

Tussi 93

Tenesmo 51

Tussi Pueroꝝ con-
vulsiva 83

V

Variolis 34

Ulcere Vesicae 91

Vomitu sanguinis, 85

Uteri proidentia
49

Epilepsia Pictoria

Medicamentorum quædam formulae in praxi magis familiares.

Potio Communis Purgativa.

℞ **T** *Amarind. ʒß. fol. Sennæ ʒij. Rhei. ʒiß. coq. f. q. aq. ad ʒiij. in Colatura dissolve Manna & Syrup. Rosar. solut. an. ʒj. m. f. Potio.*

Emeticum Commune.

℞ *Aq. Cardui Benedict. ʒij. Infus. Croc. Metal. ʒj. Syr. Caryophyll. ʒß. m. f. vomitorium. Sumat horâ 4^a. Pomeridianâ, superbibendo post singulas vomitiones haustum largum liquoris postetici.*

Julapium Perlatum.

℞ *Aq. Cerasor. nigr. lact. Alexeter. qd. ʒiij. aq. Cinnamon hordeat. ʒj. Margarit. preparat ʒiß. sacchar. Crystall. q. s. adde aq. Rosar. Damascen. ʒß. f. Julap. de quo cap. cochleat. iv. vel v. in Languoribus.*

Julapium Cardiacum.

℞ Aq. La&. Alexeter. Cerasor. nigr. an. ℥iij,
aq. Epidem. Syr. Caryophyll. & de succo Citri,
an. ℥ss, m. f. Julap. de quo capiat sæpius.

Decoctum Dieteticum.

℞ Rad. Sarsaparill. ℥vj. lign. Sassafr. &
China ana ℥ij. Glycyrrhiz. ℥j, coq. in aq. font.
Congis ij. per horæ dimidium; deinde stent
clausè super cineres calidos per horas xij. postea
ebulliant ad tertiæ partis consumptionem; Cum
primum ab igne amoveatur, infunde sem. Anisi.
℥ss, post duas horas colatur, & postea depuretur
per residentiam. & liquor reponatur lagenis vi-
treæ probè clausis ad usum. Sit pro potu or-
dinario per xxx, dies.

Apozema Aperiens & Antiscorbuticum.

℞ Rad. gramin. Cichor. Fenicul. & aspa-
rag. ana ℥j, uvarum Corinthiac. & passul. enu-
cleat. an. ℥ij, fol. hepat. ling. cerv. & cap.
Ven. an. M. j. fol. Beccabung. sub finem addit.
M. ij. coq. s. q. aq. fontan, ad ℥ij, sub finem
adde vini Rhenani ℥ss. Colaturâ adhuc ca-
lente, infunde ad duas horas, vase clauso, Cochl.
hortens. M. j. colatur. adde syr. è quinq; radic &
è succo Aurant. ana ℥ij. aq. Cinnamom. hordeat.
℥j, M. f. Apozema. Sumat ℥ss, manè &
5^a pomeridianâ per xiv, dies.

Eclegma Incrassans in Tussi.

R̄ Ol. Amygd. dulc. ℥j, Syr. Papav. R̄hæad. Portulac. Jujub. & Loboc. sani, ana ℥ss, Sacchar. crystall. q. s. M. in mortario marmoreo ad integræ horæ spatium, & f. Linctus perfectè mistus; recondatur in olla figulina, ad usum. Cap. sæpius lambend, è baculo Liquiritiæ.

Eclegma fortius incrassans.

R̄ Conserv. Ros. rub. Syr. violar. & de Mecon. an. ℥j, sem. papav. alb. ℥iij, contundantur simul & per setaceum trajiciantur, deinde adde ol. nuc. moschat. express. gr. vj, f. Eclegma.

In Defluxione tenui.

R̄ Conserv. ros. rub. ℥ij. Syr. de Mecon. & jujub. an. ℥j, Oliban. Mastich. & Succin. an. ℥j. ol. nuc. Moschat. per expressionem gr. vj. M. f. Loboch. de quo lambat sæpe; bis in die cap. eclegm. descript. cochl. j, instilland. Balsam. Sulphur. Anisat. à gut. viij, ad gut. xij.

Cerevisia Purgativa.

R̄ Polypod. Querc. ℥j, Rad. Rhabarb. Monach. fol. sennæ & passul. enucleat. ana ℥ss, Rhabarb. incis. & rad. Raphan. Rustican. an. ℥iij, fol. Cochl. hortens. salv. an. M. iv. Arrantior. incis. N° iv. infunde in Congiis v, vel vj, Cerevisiæ non lupulata, fermentationis tempore, & quando ad maturitatem pervenerit, sit pro

potu ordinario per dies *xiv*, vel *xxj*, præci-
pue verò sumat haustum singulis Auroris.

Emplastrum Hystericum.

℞ Galbani in tinctura Castor, solut. & co-
lat. ℥ij, Tacamahac. ℥ij, f. Emplast. pro um-
bilico.

Catharticum pro Infantibus tenellis.

℞ Syrup. Cichor. cum Rhabarb, Cochl. j,
parvulum.

Decoctum Amarum Purgativum.

℞ Decoct. amar. duplicatâ senâ ℥iv, Sy-
rup. de Spina Cervina ℥j. Elect. de Succ. Ro-
sar. ℥ij, M. f. Potio.

Laudanum Liquidum Authoris.

℞ Vini Hispanici ℥j, Opii ℥ij, Croci ℥j, pulv.
Cinnamomi, & Caryophyllorum an ℥j, infundan-
tur simul in B. M. per duos vel tres dies, donec
liquor debitam consistentiam acquirat & Cola-
tura servetur pro usu.

De affectione, in fœminis, hysterica; moribus, hypochondrica dicta.

CUM à casu aliquo gravius molestum patitur humana anima, ataxiam concipiunt animales spiritus; vitia subindè limpidissima copiosè excernitur; sanitatis recuperandæ spes omnis protinus abjicitur, & tristissima quævis sibi ominantur ægrotae; quamcunque corporis partem morbus infederit (plurimas autem infidet) symptomata ei parti competentia confestim urgent; in capite apoplexia, hemiplegia soluta, statim à partu adoritur; ipsa autem epilepsia per similes (vulgè uteri strangulatus, in quo venter & præcordia guttur versùs intumescunt) infestant; clavus hystericus, in quo dolor in capite atrocissimus, quem transverso pollice possis conegere, agra interim materiam viridem bili porraceæ parum evomente, miserè excruciat; cordis palpitationem, tussim, passiones iliacam & colicam, nephritin, urinæ suppressionem æmulatur pa-

roxyſmus; vomitiones enormes, diarrhœam ſubinde excitat; externè in carne muſculofa nunc dolorem nunc tumorem inducit in ribiis hydropiſ inſtar; nec (quod mireris) intactos dimittit dentes; dolor doſſi creberrimè ſævit; & ſæpe ſæpius adeò refrigerantur externæ partes, ut cadaver planè referant; in riſum & lachrymas effuſiſſimas ſine ulla *αποφύγι* ridiculè erumpunt; ptyaliſmus nonnunquam eo gradu laborantes afficit, ut Mercurio delibuta, facilè crederes. Dolores hyſterici, quacunq; partem obſident; ubi diſceſſerint, reneritudinem, quæ tangi recuſat, relinquunt, ac ſi verberatæ fuiſſent carnes.

Mittatur Sanguis ad ʒviij.

Emplaſt. de Galbano umbilico admoveatur. Sequenti manè aggrediatur uſum ſequentium pilularum;

Rx Pil. Cock. maj. ʒij, Caſtor. pulv. gr. ij. Baſſam. Peruv. gutt. iij. f. Pil. xij. Cap. iv. ſingulis vel alternis matutinis, pro ratione virium, horâ 4^a vil 5^a matutinâ, ſuperdormiendo.

Rx Aq. Rutæ ʒiv. Bryon. comp. ʒij. Caſtor. nodulo ligat. & in vitro ſuſpenſ. ʒſſ. Sacchar. Cryſtal. q. ſ. ſ. julap. de quo capiat cochl. iv, vel v, in omni languore. Poſt has pilulas ſumptas utatur ſequentibus;

Rx

R Limatur. Chalyb. gr. viij. cum s. q. Extract. Absinth. f. Pil. N^o iij. Sumat summo manè, & repetantur horâ 5^a pomeridianâ per xxx dies, superbibendo haustum Vini Absinthitis.

Sin forma boli magis arrideat.

R Conserv. Absinth. Roman. & Conserv. flaved. Aurant. an. ʒj, Angelic. condit. Nuc. Moschat. condit. & Tberias. Andromach. an. ʒss, pulv. Ari comp. ʒij, Zinzib. condit. ʒij, cum s. q. Syrup. de succ. citr. vel, ejus defectu, Syr. Aurantior. f. Electuarium.

R Elect. præscript. ʒij, limatur. Chalyb. gr. viij. cum s. q. Syrup. Aurantior. f. Bolus sumendus manè & serò, superbibendo haustum vini absinthitis, vel Cochl. vj seq. Infusionis.

R Rad. Angelic. Enul. campan. & Imperator. an. ʒj. fol. Absinth. vulg. Centaur. min. Marrub. alb. & Chamædr. an. M. j. Cort. Aurant. duor. incis. affunde vini Hispanic. q. s. ad supereminentiam duorum digitorum. Coletur tempore usus. Vel,

In Delicatulis Chalybs exhiberi poterit in forma pulv. sequentis ;

R² Limatur. Chalyb. probè trit, ʒj, pulv.
 Ari comp. ʒvj, sem. Coriand. præparat. Anisi,
 Fenicul. dulc. an. ʒss. Cinnamom. acutiss. Co-
 rall. rubr. præparat. an. ʒiij, Nuc. Moschat.
 ʒij, f. omnium pulvis subtilissimus, cui adde
 sacchar. albiss. ad pondus omnium, hujus cap. è
 Cochleari ʒss, bis in die per 4 dies, tum ʒj,
 bis in die per 40 dies, superbibend. Cochl. vj,
 seq Julap. vel vini Absinthitis.

R² Aq. Lact. Alexeter. ʒxij, Gentian. comp.
 ʒiv, Absinth. magis. comp. ʒij, sacchar. albiss.
 q. s. f. Julap. Vel ;

R² Vini Rhenan. Absinth. ʒss, aq. Gentian.
 comp. ʒij. Syr. Caryophyll. ʒj, f. Julap.

R² Myrrb. elect. Galban. ʒ Ase fatida, an.
 ʒj, Castor ʒss, cum f. q. Balsam. Peruv. f.
 Pil. è singulis drachmis xij. Sumat iij, singulis
 noctibus, superbibend. aq. Bryon. compos.
 Cochl. iij, vel iv, per totum decursum hujus
 processûs.

Si Pilule Præscriptæ ventrem moverint,
 utatur sequentibus;

R² Castor. ʒj, sal. succin. volatilis ʒss, cum
 f. q. extract. Ruræ, f. pilule N° xxiv, Cap.
 iij. singulis noctibus, superbibendo Julapii
 hysteric. Cochl. iij. vel iv.

Sp. C. C. ad gutt. *xvj.* vel *xliij.* in aqua aliqua appropriata sapius exhibitus valde confert.

Si verò his non cedat remediis, tum capiat sequentes pilulas;

R Trochisc. de Myrrh. pulv. ℥j. Balsam. sulphur. Terebinth. gutt. ℥o. cum s. q. gummi. Ammoniac. solut. f. Pil. N° ℥o. Cap. mane & serò superbib. Julap. hysteric. Cochl. iv. vel v, instillando Sp. C. C. gutt. xij.

Electuarium Antiscorbutic. cum aqua ibidem descripta prodest in his affectionibus, ut & *Electuar. corroborans. cum additione Conserv. Cochl. hortens. 3i. pulv. Ari Compos. 3vj. superbibendo præscriptam aquam.*

At si affectus his non cedat remediis, eundum est ad aquas ferreas; & si neq; his, tum ad *Sulphureas*, quales sunt *Barbomenses*.

Inter bibendum aquas ferreas hæc observanda; si aliquod Symptoma gravius acciderit, quod porationi aquarum referri potest, tunc ab his æger abstineat, donec Symptoma istud penitus evanuerit. Æger in earum usu per sex septimanas ad minimum, vel potius ad duos menses perseveret. *Zinziber conditum*, vel *Semina Caxii Saccharata*, ad calefaciendum ventericulum subinde sumat. *Pilula etiam hystericæ iij.* devorari possunt per primas *x. noctes*, superbibendo *Julap. hysteric. cochl. iv. vel v.*

Quoad usum *aquarum Bathoniensium*, duobus diebus bibat eas, ac tertio die per modum Balnei eas ingrediatur, atque ita alternatim per sex septimanas vel duos menses.

Si *Chalybs* justo plus corpus calefaciat, tum per ejus usum, quartâ quâq; Aurorâ sumat *aq. mineralium purgantium* *℥iv*. Quæ tamen si alvum moveant, haud tamen tumultum cient, ut soleat Cathartica ex officinis deprompta.

Si *Chalybs* magnas perturbationes inducat, Laudanum *aq.* aliquâ hystericâ mistum, singulis noctibus ad tempus aliquod propinandum.

Cum à morbi diuturnitate fractæ & attritæ fuerint vires, venæsectio, & cathartica non sunt præmittenda, sed à *Chalybe* statim incipiendum.

Ubi Symptomata sunt mitiora, satis est sanguinem mittere, & alvum solvere ad dies *iii.* vel *iv.* dein, pilulas hystericas ad dies *x.* manè & serò exhibere.

In dolore intolerabili, vomitione, & *Diarrhœa* enormioribus, exhibendum Laudanum, & postea corroborandi spiritus, at modò per vires liceat, ante usum Laudani, educatur de venis sanguis, & Catharticum propinetur: in viraginibus præsertim, & sanguineo temperamento præditis, in debilioribus autem, & haud ita pridem paroxysmum passis, sufficit ventriculum Congio uno lactis cerevisiati hausto,

hausto, & mox per vomitum rejecto detergere, dein largam dosin *Theriac. Androm.* vel *Elect. Orvietan.* imperare, & *Cochl.* aliquot, liquoris alicujus Spirituosi, cum pauculis Laudani liquid. guttulis, superbibenda, dare. Quod si ægra jampridem vomuerit, & ulterius emeticis sollicitare periculo non vacabit, Laudanum sine mora propinandum est, eâ dosi, quæ Symptoma vincat, & post singulas vomitiones toties quoties repetendum, in forma potissimum solida, vel in liquida, in parco vehiculo, viz. gutt. aliquot in *cochl. j.* aq. *Cinamon.* fortior ægrâ interim conquiescente, & caput immotum tenente.

Perdomito Symptomate, manè & serò, ad dies pauculos continuetur usus Laudani.

Hæc duo diligenter notanda, quod cum semel post evacuationes Laudano uti cœperimus, eâ dosi, atque illâ toties repetitâ, sumendum est, donec Symptoma omnino fuerit debellatum, interjecto tantum spatiolo inter singulas doses, ut quid prior præstiterit ante noscamus quam alteram ingeramus, deinceps cum Laudano morbum aggredimur, nihil movendum est, nihil evacuandum vel per mitissimum enema.

Theriacæ Andromachi crebro, diuq; usurpata, magnum est in hoc, & aliis morbis quamplurimis à caloris, & concoctionis defectu ortis, remedium.

Vina *Hispanica* gentianâ angelicâ absinth.
centauryo, corticum arantior. flavedine, aliisq;
corroborantibus infusis medicata, si ad ali-
quot Cochlearia per in die potentur admo-
dum conferunt, modo agra tenui non fuerit
biliosaque corporis habitu.

Cortex *Poniæ* ad ʒj. manè & serò, per
septimanas aliquot deglutitur, præsertim in
spasmodicis hysteris miras habet vires.

Id tenui biliosaque corporis habitu possit
usurpari Dieta lactea, præcipue in Colica
Hysterica, si modo ea incommoda possint
superari, quæ primis serè diebus apporras,
quod nempe tum in ventriculo coagulentur,
tum etiam viribus corporis, in statu confer-
vandis, sustentandisq; minus sufficiat.

Nihil tamen æque sanguinem spiritusque
fovet, & confirmat, ac diu multumq; singulis
serè diebus equo vehi, nec itinera in curru
facta suo carent successu.

De Febre Depuratoria amorum 1661, 62,
63, 64.

Si æger juvenis sit extrahatur sanguis &
brachio, & eodem die post aliquot horas vel
sequenti die duabus horis post leve prandium,
Emeticum ex infus. *Eroc. Metall. paratis Zy-
thogal. ʒvj. vel viij.* ut quories vomuerit, aut
alvum exoneraverit, & vestigio sumatur hau-
stus, exhibeatur; & post finitam operatio-
nem Emetici, hoc vel simile paregoricum.

Rx Aq.

R \mathcal{L} Aq. Cerasor. nigr. \mathfrak{z} ss. aq. Epidem. \mathfrak{z} ss.
Laudan. liquid. gutt. xvi. Syr. Caryophyll. \mathfrak{z} ii.
M. F. Haustus.

Vomitoria ex infus. Croc. Metall. parata,
puerulis, ullisve infra adolescentiam consti-
tutis, vel minimâ quantitate, non est tutum
exhibere.

Post hunc diem usque ad undecimum vel
duodecimum singulis Auroris injiciatur ene-
ma sequens ;

R \mathcal{L} Decoct. commun. pra. Clystere \mathfrak{t} j. (vel la-
ctis vaccini eandem quantitate) Sacchar. Cidi-
nar. & Syrup. violac. an. \mathfrak{z} ij. f. Enema.

Post dictum diem alvus constipari peripie-
tatur, quo materia febrilis citius concoqua-
tur, ad quem etiam finem Cardiaca mode-
rata his ultimis diebus exhibita apprimè con-
ducunt ; ut,

R \mathcal{L} Pulv. è Coch. Cancrar. comp. gr. xiv. E-
lect. de Ova \mathfrak{z} ss. cum s. q. Syr. Caryophyll. f.
Bolus firmendus octavâ quâque horâ, super-
bibendo sequentis Julapii Coch. \mathfrak{v} , vel \mathfrak{vj} .

R \mathcal{L} Aq. Lact. Alexeter. Cerasor. nigr. an. \mathfrak{z} iiij.
Aq. Epidem. & Syr. Caryophyll. an. \mathfrak{z} ss. M. F.
Julap. vel alia his similia.

Hac methodo sollicitè observatâ, uscatò
circa xv. diem (tum ex laudabili in urina se-
paratione,

paratione, tum ex manifesta Symptomatum omnium remissione) tempestivum esse Portionem Purgantem communem exhibere percipies.

Accidit interdum maximè in Senibus, curatâ Febre, & purgato corpore, ægrum nihilominus valdè debilem esse, & quandoque rufsi, interdum etiam sreatu, magnam glutinosi viscosique phlegmatis copiam expectorare. Hoc in casu vinum Malaganum annosum, cum pane tosto ei immisso, bibat æger.

Si superveniat Iliaca passio, præscribatur Sal. Abinth. ʒj. ex Coch. j. Suc. Limonum, manè & Serò, intermediis temporibus cap. Aq. menth. stillatit. sine Saccharo, Coch. aliquot, bis quâq; horâ, dum hæc fiunt, catulus vivens nudo ventri indefinenter accumbat, postquam dolor cum vomitu, per biduum triduumve cessaverit, exhibeatur *Pill. Coch. maj.* ʒj. in *Aq. Menth.* soluta, nec removendus catulus ante pilularum usum.

Ad recidivam præcavendam, persistat in usu prædictæ aquæ per longum tempus, & duplicatis pannis laneis ventrem à frigore defendat.

De Febre Pestilentiali 1665, 66.

Post venæsectionem in lecto celebrandam, æger stragulis obruatur, & Lacinia Lanea

fin-

incipiti alligetur ; tum, si vomitus non adsit, hoc vel simile Hydroticum exhibe.

Rx Theriac. Andromach. ʒss. Elect. de ov. ʒj. Pulv. è chel. cancr. comp. gr. xii. Coccinel. gr. viij. Croc. gr. iv. cum s. q. succ. kermes, f. Bolus, quem sumat sextâ quâque horâ, superbibendo Cochl. vj. seq. Julapii.

Rx Aq. Card. Benedict. & Scord. compos. an. ʒiv. Aq. Theriacal. stillatit. ʒij. Syr. caryophil. ʒi. M. F. Julapium.

Si adsit vomitio, hydroticum differatur, donec solo regumentorum pondere sudor promanare incipiat, linteaminis parte vultui superinductâ.

Incepta Diaphoresis haustulis Zythogalæ salviâ alteratæ, vel Cerevisiæ cui macis aliquantum incoxeris subinde repetitis ad naturalis diei spatium (i. e. horas 24.) est continuanda ; in sudore licet jussulis confortativis ægrum reficere.

Ubi tumor enatus fuerit, venam aperire non sustinui ; per horas adhuc à finito sudore .xxiv. ægro se in lecto continente frigus caute deviteretur. Indusium sponte suâ in corpore arefcere permittatur, potulenta omnia calidiusculè hauriantur, & Zythogalæ salviâ alteratæ usus etiamnum continuetur, in seq. luce potio purgat. communis exhibeatur.

Anni 1667, 1668. Febrim Variolosam & Variolas produxerunt.

Anni 1669, 70, 71, 72. Febrim Dyntericam.

Anni 1673, 74, 75. Febrim Comatosam.

Curationem februm horum annorum non attingo; quoniam methodo in febre anni 1685, &c. descriptâ curari eas potuisse autumo.

De Febris Intermittentibus.

Cum rigore & horrore adoritur paroxysmus, quibus mox succedit calor, & hinc tandem sudor, & subsequens eruptio: licet in primis morbi diebus, Autumno maximè, aliquoties remissio potius quàm intermissio perlentiscitur, in calore æque ac in rigore vomiturit ut plurimum ac vehementer ægrotat miser cum siti & lingua arida. In tenera ætate abdominis inflatio, in adultis crurum tumor febris solutionem; tonsillarum dolor, rauco, oculi cavi, facies Hippocratica, mortem denunciant.

℞. Cora. Penur. subtiliss. pulv. ʒi. cum s. q. Syr. Caryophyll. vel de Roso sicin. f. Electuarium dividendum in xii. doses; quarum unam capiat quartâ quâque horâ, superbibendo Vini cujusslibet haustum, incipiend. immediate post paroxysmum.

Si

Si autem præscripti boli ventrem move-
rint, in haustu Vini dentur *gutt. x. Landan.*
liquid. singulis vel alternis vicibus post as-
sumptionem boli, ut opus fuerit.

Ad recidivam præcavendam (præcipuè
in quartana) repetatur prococtus prædictus
singulis septimanis per tres alias vices.

Sin forma Pilularum magis arrideat.

R̄ Cort. Peruv. pulv. ʒi. cum s. q. Syrup.
caryophyll. f. Pilulæ mediocris magnitudinis.
quarum capiat vi. quartâ quâque horâ.

R̄ Cort. Peruv. pulv. ʒii. Vin. Rhenan. ʒii.
stent simul in Infusione frigida, & colorur per
manicam Hippocratis. Usus tempore cap. ʒiii.
tertiâ vel quartâ quâq; horâ.

Sin ob vomituritionem, ferè continuam,
Corticem deglutire nequeat æger, tum sexies,
vel octies, Spatio duarum horarum, *Succi*
Limonum recens expressi Cochl. j. cum Salt.
Abstinb. ʒj. assumat, dein Landan. Liquid.
gutt. xvi. cum Aq. cinnam. fortior. Cochl. j.
ac brevi post, cessante vomitu, Corticis usum
aggrediatur.

In intermittentibus vernalibus, nonnun-
quam emeticum, tempestivè propinatum, ut
nempè ante paroxysmum negotio suo defun-
gi possit, foelicitissimè successit. Nonnunquam
Enema in diebus intermittentibus, per tri-
dium, vel quatrimum injectum, Curationem

nem absolvit. Quæ sequenti quoq; modo tentari potest.

Rx *Serpentar. Virgin. subtiliss. pulverifat. gr. xv. Vin. alb. ziii.* Sumat duabus horis ante Paroxysmum, & stragulis coopertus æger sudet per *iii.* vel *iv.* horas; idem faciendo per duas alias vices ante Paroxysmum.

Si ab ingeminatis paroxysmis summè debilis fuerit æger ;

Rx *Conserv. Flor. Borag. Bugloss. an. zi. conserv. Anthos. zss. cort. citr. condit. Nuc. Moschat. condit. Theriac. Andromach. an. ziii confectio. Alchermes. zii. M. F. Opiata cap. ad quantitatem avellanæ, manè & vesperti, superbibendo Cochlearia pauca, alicujus Aq. Epidemicæ simplicioris, Saccharo edulcoratæ, interdicto interim enematum usu.*

Si sub morbi exitum occurrat hydrops, nondum tamen depulsâ Febre curatio non est instituenda remediis purgantibus, sed infusionibus rad *Raphan. Rustican. Summitat. Absinth. centaur. Min. Baccar. Juniper. cinerum genist. &c.* in vino factis, exulante autem Febre, Catharticis, & aperientibus.

Pro Infantibus Febre intermittente laborantibus.

Rx *Aq. cerasor. nigr. & Vini Rhenan. an. zii cort. Peruv. subtiliss. pulv. ziii. Syr. caryophyll.*

phyl. 3i. *M. F. Julap.* Cap. *Cochl.* j. alterumvè, pro ratione ætatis, quartâ quâq; horâ, donec Paroxysmi non amplius disrueant, instillando alternis vicibus, si Diarrhoea adfuerit; Laud. liquid, gutt. i. vel ii.

De Febre Stationaria, ab an. 1685, ad 90.

Calor & frigus se invicem excipiunt, artus pariter & Caput dolent, pulsus interim ferè sanus, nonnunquam tussis, dolor circa collum & fauces, exacerbatio Febris prope noctem, inquietudo, sitis, lingua vel humida & ex omni parte pelliculâ albâ & scabrâ vestita, vel Sicca, fusci coloris in medio, quam partem undiq; cingit fimbria inalbescens. A jugi in lecto decubitu coma & phrenesis, à Calido regimine petechiæ, maculæ purpureæ, eruptiones (quas vocant) miliares morbillis magis rubentes, pulsus inordinatus, tendinum subsultus, atque ita tandem mors. Sudores in initio symptomatici divexant, qui si ab arte provocentur, viscosi à Capite erumpunt, & materiam morificam in Caput aut in artus transferunt.

Mittat. Sanguis ad 3x. è brachio. Reiteretur Venæsectio; si modò respirationis difficultas, dolor Capitis inter tussendum lancinans, & alia signa Peripneumoniæ nothæ adsint. In hoc casu tam venæsectio quàm Catharsis reperenda, donec æger convalescat.

Ve-

Vesperis applicetur Epispasticum & sequen-
ti Aurorâ Potio Lenitiva præscribatur, quæ
ad tertiam vicem alternis diebus repetatur,
& horâ somni post Catharsin haustus pacifi-
cus propinetur.

*R^x Aq. Paralyf. ℥iij. Syr. de Mecon. ℥i.
Succ. Limon. recent. Extract. cochl. ii. M. F.
Haustus.*

Aphthæ & singultus sponte sua post curatio-
nem febris supervenientes sponte evanescunt ;
Si in longum tempus decurrant, facile fugan-
tur Cortic. Peruv. ℥i. cum Syr. Papav. Rhoad.
q. s. in formam Electuar. vel pilular. redactâ,
superbibend. haustum lactis destorati. Re-
medium hoc certissimè scopum attinget, si
non frustrentur ejus vires ex jugi ægri in-
lecto decubitu.

Diebus à purgatione liberis sequentia præ-
scribantur.

*R^x Consero. Lujul. & cynosbat. an. ℥i. con-
sero. Berber. ℥ss. crem. Tart. ℥i. cum s. q.
Syr. de Limonib. f. Electuarium, de quo cap.
ad magnitud. Nuc. Moschat. ter in die, su-
perbibendo sequent. Julap. Cochl. vj.*

*R^x Aq. Porculac. Lactno. Paralyf. an. ℥ij.
Syr. de Limonib. ℥ss. Syr. Violar. ℥j. M. f.
Julapium. Vel*

R. Aq. font. ℥ij. Aq. Rosar. Succ. Limonum Sacchar. albiss. an. ℥iv. coq. leno igne dum despumaverint, cap. ℥iij. ad bibicam. præscribatur quoque seq. gargarisma.

R. Succ. Pomor. agrest. ℥ss. Syr. de rubo. ℥i. decozj. m. f. gargarisma.

Si febris ita ventriculum infestet, ut æger portionem retinere nequeat, *Pil. Coch. maj. ad aij.* exhibeantur, tum etiam hypnoticum est concedendum, *v. gr. Laudan. Londin. gr. iss.* cum simili quantitate Mastich. vel Laudan. Liquid. gut. xvij, in aq. Cinnamon. bordeat. 3j.

Decoctum album paratum, ex 3j. C. C. usti, in aq. communis ℥iij. cocti & postea Saccharo albissimo edulcoratum. sit pro potu, ut & Cerevisia tenuis pro libitu.

Post Catharsin bis celebratam, concedatur ægro, Pullorum carnibus vesci, & post ultimam Purgationem modo febris aliquantulum deflagaverit, vini Canarini cochl. iij, vel iv, manè, & sero, ut & post Prandium, per dies aliquot propinentur.

In Phrenitide, ut & Comate, nihil perinde confert, atq; ægri caput radi, nullo admoto Emplastro, sed Pileolo tantum.

Si

Si (quod feminis hystericis quandoq; accidit) post venæsectionem, & purgationes, huiusmodi iteratas, etiamnum durer, procurratque febris, modo signa Peripneumoniæ, & inflammationis circa partes vitales absint, Singulis noctibus Paregoricum, & medicamenta hystERICA, bis vel ter in die, injungantur.

De Infantibus febre Stationariâ laborantibus.

Hirudines duæ utrinq; ponè aures applicentur, dein *Emplastr. Epispastioum* cervici admoveatur.

Cerevisiâ, quâ Rhabarbarum fuerit infusum, purgetur.

Si post Catharsin febris intermittere videatur, tum *Fulapium cum Cortice Peruviano* (in Capite de febre intermittenti pro infantibus descriptum) exhibeatur.

De febre Scarlatina.

Æstate exeunte, infantes præcipuè infestant. Rigent & horrent sub initium; nec tamen admodum ægrotant; cutis universa maculis parvis, rubris, crebrioribus, latioribus & magis rubentibus quàm in morbillis, interstinguitur: Ad duos tresve dies persistant, quo quidem tempore evanescunt, & decedente subjectâ cuticulâ, squammulis surfuraceis, ad instar farinæ, cutis conspergitur.

℞ C. C. usti & pulv. è Chel. cancr. comp.
an ʒʒ, Coccinel. gr. ij, Sacchar. Crystall. ʒj, M. f.
pulv. subtiliss. in xij, Chartulas dividend. qua-
rum unam Cap. 6^a quâque horâ, superbi-
bendo cochl. ij, vel iij, sequentis Julapii.

℞ Aq. Cerasor. nigr. aq. Lactis Alexeter. an.
ʒiij, Syr. è succ. citri ʒj, M. f. Julap.

Applicetur etiam Epispasticum cervici, &
qualibet nocte paregoricum ex Syr. de Mecon.
propinetur, & postquam symptomata cessa-
verint, purgetur æger.

De pleuritide.

Inter Ver & Æstatem dominatur. Arigore
& horrore orditur, quos statim comitantur
calor, sitis, inquietudo & cætera febrium
symptomata; elapsis pauculis horis, æger ve-
hementi dolore punctorio in laterum alter-
utro circa costas corripitur, qui nunc versis
omoplatas, nunc spinam, nunc anteriora pe-
ctoris sese propagat, tussi crebrâ excruciat,ur,
Materia sputo rejecta in initio morbi pauca est
& tenuis, & sæpe sanguinis particulis inter-
mixta, progressu verò copiosior, & magis con-
cocta, sanguine etiam permixto. Febris pa-
ri passu incedit cum tussi, sputo sanguinis,
dolore, & pro ratione liberioris expectora-
tionis sensim imminuitur; nunc alvus est
astricta, nunc soluta nimis. Eductus è ve-
na sanguis sevi liquati speciem præ se fert ubi
refruxerit.

Mitta-

Mittatur sanguis è brachio lateris affecti
ad 3x.

Rx Aq. Papav. R^{ba} ad. ʒiv, Sal. Prunel. ʒj,
Syr. Violar. ʒj. M. f. Haustus, fumendus sta-
tim à prima venæ sectione.

Rx Amygd. dulc. excoctar. N^o v, sem Me-
liss. Peponi. an. ʒss. sem papav. alb. ʒij, aq.
bord. ʒss, aq. Rosar. ʒij, cum s. q. sacchar.
cand. f. f. a. Emulso, Cap. ʒiv, 4^a quâque
horâ.

Rx Decoct. Pectoral. ʒij, Syr. Violar. ʒ
Cap. Ven. an. ʒiss, M. f. Apozema. Cap. ʒss,
ter in die.

Rx Ol. Amygd. dulc. ʒij, Syr. Violar. ʒ
Cap. Ven. an. ʒj, Sacchar. Cand. q. s. M. f.
Eclogma, de quo sæpe lambar.

Oleum Amygd. dulc. per se, vel Oleum sem.
Lini recenter extracti, exhiberi potest.

Rx Ol. Amygd. dulc. Lilior. ʒ unguent. Di-
albææ, an. ʒj, M. f. Linimentum, quo inun-
gatur latus affectum manè & serò superim-
ponendo fol. Brassicæ.

Repetatur Venæsectio ad tres alias vices,
ad eandem quantitatem, quatuor diebus
continuis, ubi dolor & respirandi difficultas
sistat.

De

De peripneumonia notha.

Ingruente hyeme & sæpe sub ejus exitum emergit, insultu primo nunc incalescit nunc friget æger, ex motu quolibet vertiginosus est, rubent & inflammantur genæ oculiq; tussit, & inter tussendum dolor capitis lancinans premit, porulenta vomitu rejicit, urina turbida est & intense ruber, sanguis pleuritico- rum æmulus, anhelus crebro & celeriter spiritum ducit, dolente thorace. Ab asthma- te sicco planè distinguitur, quod in isto nus- quam comparent febris indicia, in hac mani- festo se produnt, licet minora longe & magis obscura quam in peripneumonia vera.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad 3x. Die sequenti æger hanc potionem sumat.

R. Cassiæ extract. ʒj. Glycy. ʒij. siqus pin- guis No. v. fol. semm. ʒiiss. Agaric trochiscat. ʒj. coq. s. q. aquæ ad ʒiv. in Colatur. dissolv. Manna ʒj. Syr. Rosar. solut. ʒss.

Si verò potionem assumere nequeat, *Cap. Pil. coch. maj. ʒij. horâ quartâ matutinâ.*

Sequenti die celebretur iterum venæsectio, ad eandem quantiratem; ac postero die repe- tatur Catharsis, quæ porro repetenda est alter- nis diebus, vel post majora intervallâ, pro ratione virium; Atq; insuper si Symptomata non cessaverint, extrahatur iterum sanguis semel adhuc, bis, vel sæpius, diebus aliquot

interjectis, prout res postulaverit; sed ut plurimum venæsectio bis celebrata sufficiet, Interim, dum hæc fiunt, præsertim in diebus à purgatione vacuis, utatur *decocto Pectorali, Eclegmate & oleo Amygd. dulcium*, in Pleuritide descriptis.

De Rheumatismo.

Rigorem & horrorem & cætera febrium symptomata patiuntur, elapso die uno alterove (est & ubi citius) dolor adest atrox nunc in hoc nunc in illo artu, in carpis, humeris & genibus præsertim, vicissim hos relinquens & illos occupans, rubore & tumore in parte, quam postremum affecit, adhuc residuis. Febris sensim evanescit, manente dolore, quin & nonnunquam immanis sæviante. In lumbagine rheumatica immanis dolor adest, circa lumborum regionem fixus, nephritin meriens, nisi quod æger non vomituria, qui procumbere nequit, sed vel è lecto exilit, vel super eodem erectus sedet, corpore perpetua agitatione nunc versus anteriora, nunc posteriora inclinato. Sanguis pleuriticorum similis.

Mittatur Sanguis è brachio lateris affecti, ad 5x.

℞ *Aq. Nymph. Portulac. Lactuc. an. ʒiij.*
Syr. de Limonib. ʒiij. Syr. Violac. ʒj. M. f.
Tulap. de quo bibat ad libitum.

Præ-

Præscribend. *Emulsio 4. Sem. frigid. maj.*
Cataplasma è mica panis albiss. & lacte Croca-
tincto applicetur parti dolenti.

Die sequenti eadem sanguinis quantitas de-
 trahatur; atq; iterum, die uno vel altero in-
 terjecto, reiteretur, atq; porro quater vel plu-
 ries, si opus fuerit, hoc observando, ut post
 secundam Venæsectionem majora sint inter-
 valla inter singulas sanguinis missiones.

Diebus à Phlebotomia vacuis Enema &
 lacte saccharato subinde injiciatur, vel se-
 quens;

R. Decoct. commun. pro Clystere ℞j. Syr.
Violar. & Sacchar. culinar. an. ʒij. M. f. E-
nema.

Si Imbecillitas ægri repetitionem Phlebo-
 tomie non ferat, tunc post secundam vel ter-
 tiam venæsectionem Curatio hac metodo
 remanda.

Capiat alternis diebus potionem purgati-
 vam communem, donec convalescat, & eidem
 noctibus Purgorie. ex Syr. de Mecon.

Sin his remediis non cedat, & æger ob im-
 becillitatem evacuationes qualescunque ferre
 nequeat, aggrediatur usus Elett. & aq. An-
 tiscorbutic. in scorbuto descripti. quæ etiam
 remedia locum habent in Rheumatismo
 Scorbutico.

In Juvenibus, atq; iis qui temperate vixe-
 runt, vino non plus æquo dediti, Rheuma-

tilimus Diætâ simplici admodum refrigerante, & mediocriter nutriente, æq; foeliciter, ac repetitis Venæsectionibus (quas minus ferre queant) profligari potest. Ex. grat.

Solo Lactis sero ad dies quatuor vescatur æger, postea præter serum pane limilagineo semel in die loco prandii, donec penitus convalescat; nisi quod postremis diebus iterum panem in cœnam indulgere liceat. Symptomatis cessantibus, carnes pullorum elixorum, ceteraq; eupepta concedantur, tertio autem quoq; die solo lactis sero victi-
 ter, donec tandem pancreaticè valeat.

De febre erysipelatosa.

Nulla non corporis pars, præsertim facies, tumet, dolet & summè rubet, pustulæ densæ, parvæ, in vesiculas subinde facessunt, quæ per frontem caputq; serpunt, oculi tumore ob-
 ruti, rigor & horror atq; reliqua febris indicia adsunt. In alia hujus morbi specie, liquo-
 rum attenuantium potationi superveniente, febricula adest, pustulæ urticarum punctu-
 ras referentes, nonnunquam in vesiculas sublatae, mox recedentes, tuberculorum more sub cute se condentes, maximè pruriunt, & scaspando rursus apparent. Est & alia e-
 ruptionis species, pectus ut plurimum obfi-
 dens, macula nimirum lata, cuti vix superem-
 inens, porriginosa, cum squammulis flavis,
 qua

qua vigente, æger bepe se habet, eâdem evanescente, leviter ægrotat, urina turbida & flava, iisdem remediis, quibus pruritus ferinus, cedit, vino utatur æger & carnibus eupeptis.

Mittatur sanguis è brachio ad ʒij , vel x . Die sequenti sumat *portionem communem purgativam*.

R Rad. *Althææ* & *Lilior.* an. ʒj . fol. *Malv. Sambuc. Verbas.* flor. *Chamamel. Melilot.* summitat. *Hyperic.* & *centaur. minor.* an. M. l . sem. *Lini*, *fœnugræc.* an. ʒß , coq. $\text{ʒ. q. aq. ad ʒiiij}$. Coletur liquor, & tempore usus adde singulis libris decocti *Sp. Vini ʒij*. Stuphæ è panno laneo huic decocto immersæ, ac expressæ, calidè admoveantur bis in die, & pars affecta post forum sequenti mixturâ illinatur.

R *Sp. Vini ʒß. Theriac. Androm.* ʒij . pulv. *piperis longi*, & *Caryophyll.* an. ʒij . f. mixtura. quâ Charta Emporeica madefacta parti affectæ circumvolvatur.

Si primæ venæsectioni non cedat morbus, tum repetatur; & nondum cessante, ad duas alias vices celebretur, interposito semper die uno.

Diebus à Venæsectione liberis *Enema è lacte cum Syr. Violarum, Emulsio Refrigerans* & *Zulap. refrigerans*, sunt præscribenda.

De pruritu ferino, & inveteratis cutis eruptionibus, quæ Venæsectioni & Catharfi non cedunt.

R̄ Theriac. Andromach. 3ss. Elect. de ovo
dj. rad. Serpentar. Virgin. subtiliss. pulver. gr.
xx. Lapid. Bezoar. oriental. gr. v. cum f. q.
Syr. è conditur. citri. f. Bolus, hora somni
sumendus per dies xxj. sepebibendo cochl.
vj. sequent. Jalapii.

R̄ Aq. Card. Benedict. 3vj. aq. Epidem. &
Theriacal. Scillar. an. 3ij. Symp. Caryophyll. 3j.
M. f. Julap.

Singulis matutinis cap. liquoris possitici
nss. calidè, & sudet hora unius spatii.

His finitis, si pustulæ adhuc non exanue-
rint, sequenti Linimento partes affectæ inun-
gantur.

R̄ Unguent. ex Oxylapatho 3j. Unguent.
Pentarij 3j. flor. Sulphur. 3iij. ol. Rhodii 3ss.
f. Linimentum.

Veruntamen Medicamenta præscripta
haud usurpentur, nisi Venæsectione & Ca-
tharfi ritè præmissis.

De Angina.

Angina inter Ver & Æstatem ut plurimum
aggredditur. Sequuntur febris insutum do-
lor & faucium inflammatio, unde à tumore
uvulæ

unula, tonsillarum & laryngis, nec deglutire
queat Ager, nec spiritum ducere.

Mittatur Sanguis e Brachio copiose. Tan-
gantur partes inflammatae melle Rosaceo, Sp.
Vitrioli, vel Sp. Sulphuris ad summum acorem
permixso, vel Sp. Vitrioli solo. Mox Garga-
risma sequens usurperur, non vulgari modo;
sed ita ut sine ulla agitatione in ore conti-
neatur, donec incalescat, dein expuatur, &
reperatur subinde.

Rx Aq. Plantag. Ros. Rubr. & Sperm. Ra-
nar. an. ziv. album. ovar. in aquam agitando
redact. N° iij. Sacchar. Crystal. ziiij. M. f.
Gargarisma.

Emulsio Refrigerans in Pleuritide descripta
indies sumatur.

Sequenti mane, nisi febris & dolor inter
deglutendum remiserint, Venæsectio repe-
ratur, Catharsi in diem posterum rejecta, a-
lias Catharticum lenius exhibeantur.

Manente adhuc affectu (quod oppide ra-
rum) reperatur adhuc Venæsectio, & Ca-
tharsis; Epispasticum amplum ac forte ap-
plicetur cervici post primam Venæsectionem.
Omni mane, nisi diebus purgationi datis Ene-
ma refrigerans & Emolliens injiciatur; Dieta
tenui utatur æger, & lecto per horas ali-
quot quotidie absistat.

In his omnibus febris, quas intercurrentes appello, ut etiam in illa, quæ stationaria est, caute observandum, quod æger à lecto abstineat magnam diem partem, ut iusculis hordeaceis, avenaceis, ac id genus aliis victet, & cerevilliam tenuem Lupulatam & hydrogatam pro potu ordinario bibat.

De Morbillis.

Infantes plerumq; impetunt. Primo die rigent horrentque, calent & frigent alternatim. Secundo consummatam febrim accersunt. Aegritudo vehemens, sitis, inappetentia, lingua alba (non verò sicca) tussicula, capitis & oculorum gravedo, & somnolentia perpetua, acriter premunt, humor è naribus & oculis jugiter stillat (quæ lachrymæ certissimum morbillorum signum.) Huc accedunt sternutatio, tumor palpebrarum paulo ante eruptionem, vomitus, diarrhoea, cum dejectionibus colore viridi in dentitionibus præsertim. Symptomata ingravescent ad quartum usq; diem, quo quidem die (nonnunquam quinto, in fronte & facie maculæ parvæ, rubræ, pulicum moribus persimiles prodeunt, quæ numero & magnitudine auctæ racematim coalescunt, & faciem maculis rubris majusculis interstinguunt: Hæ maculæ è parvulis papulis, supra cutim paululum elevatis consistunt, quarum protuberantia

rantia digito levi, vix oculorum acie, deprehendi possit.

A facie, quam primò solum occupant, ad pectus ventremque, crura deinde tibiasque propagantur maculae; in his autem partibus latae & rubrae, superficiem cutis non superantes compiciuntur. Eruptione morbillorum non perinde deliniuntur Symptomata ac in variolis. Vomitus post eruptionem nullus; sed tussicula & febris cum spirandi difficultate intenduntur, in oculos defluxio, somnolentia & inappetentia perseverant. Die sexto aut circiter frons & facies asperescunt, emorientibus pustulis, ruptaq; cuticulâ, in reliquo corpore maculae latissimae sunt, & maximè rubescunt, Octavo circiter die in facie evanescent, & vix in reliquo corpore permanent. Nono nullae prorsus sunt; per faciem verò & artus quandoq; & totum corpus in farinam quandam & squammulas facessunt, & tunc temporis febris, spirandi difficultas & tussicula augentur. In adultis à calido regimine livescunt primò, mox nigrescunt exanthemata.

Rx Decoct. Pectoral. ziss. Syrup. Violac. & Cap. Ven. an. ziss. M. f. Apozema; Cap. ziss. vel xv. ter vel quater in die.

Rx Ol. Amygd. dulc. ziss. Syr. Violac. & Cap. ven. an. 3j. Sacchar. Cand. albiss. q. s.

M. f. Eclogna, de quo sæpius lambat, præcipuè quando tussis urget.

R. Aq. Cerafor. nigr. ℥iij. Syr de Mecon. ℥j. M. f. haustus singulis noctibus sumendus, à primo morbi insultu, usq; dum convalescerit æger, dosin augendo vel imminuendo pro ratione ætatis.

Æger se contineat in lecto per biduum post primam eruptionem.

Si post Morbillorum discessum, Febris, respirandi difficultas, & alia Symptomata Peripneumoniam mentientia supervenerint, sanguis liberaliter extrahendus è brachio, semel, bis, vel ter, prout opus fuerit, convenienti spatio interposito inter singulas Venæsectiones; Atq; etiam continuentur decodum Pectorale supra descriptum, ut & *Loboch*, vel *Ol. Amygd. dulo. per se.* Circa diem xij. ab invasione Cathartico lenienti purgetur.

Diarrhoea, quæ morbillos excipit, Venæsectione sanatur.

De Variolis.

Distinctæ sunt vel confluentes, & in distinctis invadunt rigor & horror, calor intensus, capitis & dorsi dolor vehemens, vomituritio, in adultis ingens in sudores propensio (& hinc minime confluxuras esse licet coniectare) dolor sub scrobiculo cordis si

manu

manu prematur, stupor & somnolentia, non-
nunquam & insultus epileptici) (in infanti-
bus præsertim) quibus si, dentitione peractâ
corripiaitur, in procinctu esse variolas possis
prædicere, ita ut si fortè insultum epilepti-
cum sub vesperam patiantur, sequenti Auro-
râ in conspectum se dentur sunt variolæ, mi-
tes ut plurimum & rarissime confluentes.
Quarto inclusive ab invasione die nonnun-
quam serius, raro tamen ante illum erum-
punt, quo tempore vel minuuntur Sympto-
mata vel profus evanescent. In eruptione
autem subrubræ primò pustulæ, tenuissimæ
acicularum puncta æquantes, sparsim se
produnt per faciem, collum, pectus, & cor-
pus universum; tunc in faucibus dolor, qui
cum pustulis surgentibus augetur. Circiter
octavum à primo insultu diem intervalla pu-
stularum prius alba rubere jam incipiunt, in
tumorem anfolli, & dolore tensivo affici; ex-
tenduntur palpebræ, & ut vesica inflata, oculos
claudunt. Proximæ à facie innumescunt
manus, digitiq; distenduntur; pustulæ faciei
antè læves & rubræ, jam asperæ (primum
maturationis indicium) & subalbide appa-
rent, succum insuper luteum, colore à favo
non abtudentem evomunt faciei & in osium
inflammatio jam summa in pustularum inten-
sissimis colorem exhibet floridum, & rosarum
Damascenarum remulum, quem quidem colo-
rem, quoniam tiores sunt variolæ, eo magis tum

pustulis cum cutis interjecta arctata sunt ex-
 primunt. Quae faciem occupant pustulae
 asperiores quotidie ac magis flavae pro iniqua
 rationis ratione, quae manus & reliquum cor-
 poris minus asperae albaeque magis conspiciun-
 tur indies. Die undecimo faciei tumor &
 inflammatio recedunt, pustulae maturae &
 postant magnitudinem (viz. pili grandisculi)
 adepta estare solent deciduntque. Decimo
 quarto vel quinto pereunt funditus si manu-
 um autem pustulae peripacipres, albae adhuc
 & recentes die uno aut altero moras trahunt
 & tandem dirumpuntur, ceterae autem, sa-
 tis minime & corporis dequantantur, &
 in facie squamulis hisce furfuraceis succedunt
 lotae. Per totum morbi decursum
 atrox vel prorsus constipatur vel rarissime
 deiecit. Maxima eorum pars, qui ex hoc
 morbo pereunt, octavo die in discretis, un-
 decimo autem in confluentibus intereunt.
 Quippe cum in discreto hoc genere promo-
 ventur sudores tum cardiacis tum regimine
 calidiores, praedicto die facies, quae virgida
 & per interstitia pustulis interjecta inflama-
 menti debuerat, & contra flaccida reperitur
 & albescens, pustulis nihilo minus rubenti-
 bus & elevatis, etiam post aegri mortem;
 sudor, qui huc usque manaverat, dorepente
 evanescit, aeger interim phrenitide corripit-
 ur, anxietate, jactatione, agnitudine, vel
 vehementibus, urinam parce reddit ac frequen-
 ter,

ter, & tandem paucissimarum horarum spatio ad plures migrat.

In Confluentibus eadem Symptomata (sed atrociora) febris scilicet, anxietas, aggritudo, vomitatio, &c. immanius seviunt; licet non ita promptè, ac in discretis, in sudores dissolvitur æger. Diarrhoea nonnunquam eruptionem præcedit, & ad diem unum aut alterum post illam protrahitur, quod in discretis vix contingit. Tertio die aut citius, raro tardius, erumpunt; & quo citius, eo magis confluent. Quandoq; ad quartum vel quintum diem differtur eruptio ob atrox aliquod symptoma, n. g. acutissimum dolorem in lumbis, nephritici simulum, in latere pleuritici, in artubus rheumatici, in ventriculo cum ingenti aggritudine & vomitu. Non perinde, ac in discretis, mox ab eruptione remittunt symptomata, sed & febris & alia ad multos etiam dies post eruptionem pustularum ægrum discruciant; Nunc erysipelas ruit, nunc morbillorum erumpunt, eruptionis licet tempore planè distinguantur. Crescente morbo, non in molem aliquam spectabilem attolluntur; sed in facie sibi invicem implicite, tanquam vesicula rubra, vultum omnem contegunt, quem maturius elevant quam discretæ: postmodum ad instar pelliculæ albae vultui agglutinatae cutis superficiem non admodum superant. Præterlapso die octavo, pellicula alba quotidie paulatim

magis
santo magis confluit

magis exasperatur, colore fusco: Intensus magis est dolor cutis, donec tandem in eruculentiori morbo non nisi post diem vicesimum latioribus lamina desquamatur. Hoc interim observatu dignum, quod quanto pustulae maturescentes proprius ad colorem subfuscum vergunt, eo deteriores lentius abscedunt; quo magis autem flavescent, eo minus confluxerint, & cecius se proripiant. Ubi primum deciderit pellicula, nullâ scabritie vultus afficitur; at verò mox illam excipiunt squamulae fursuraceae, indolis perquam corrosivae, quae foveas relinquunt patentiores, & saepe cicatrices. Quandoque humeri & dorsum cuticulâ denudantur. Morbi periculum à pustularum frequentia & numero in facie solâ, aestimandum. Pustulae manuum & pedum majores, & quo altius ab extremitate artuum ascenderis, eo sensim minores & contractiores extant. In adultis salivatio in infantibus diarrhoea (licet non ita certo) confluentium comes. Præstans hunc cum eruptione se prodit, nunc biduo triduove præterito, materiam primò tenuem, die undecimo viscidiorē ægerrimè excreat. Siticulosus est æger, voce raucâ, somnolentiâ & stupore ingentibus corripitur, inter bibendum subinde ruffit, & potus per nares revertitur. Tunc cessat ut plurimum salivatio, cui nisi faciei intumescencia (quæ licet hoc ipso die pro morbigenio aliquantisper remitti de-

beat,

beat, non tamen nisi post diem unum alterumve omnino recedere) & manuum jam insigniter incipiens & diutius perdurans superpetias tulerint, ægro protinus moriendum est.

Diarrhoea non ita maturè infantes occupat ac pryalismus adultos. In utraq; variolarum specie febris ab insultu ad eruptionem dominatur, inde dat inducias ad pustularum maturationem, quâ peractâ, desinit. Superveniunt à malo regimine symptomata anomala; quæ sunt, pustularum flacciditas & subsidencia, phrenitis, coma, maculæ purpureæ pustulis interspersæ, & in earum summitate maculæ nigræ exiguæ in medio subfidentes, sanguinis mictus & sputum sub initio morbi, urinæ suppressio.

Separationis tempus cum febrili ebullitione tribus vel quatuor primis diebus transigitur: Expulsio per reliquum morbi tempus, mediantibus parvis abscessibus, in carne perficitur.

Dies in quo maximè periclitatur æger, in confluentibus in minimè crudo, & maximè vulgari genere, à primo morbi insultu, est undecimus, in crudiore adhuc decimus quartus, & in crudissimo decimus septimus; nonnunquam tamen sed rarius, non ante diem vicesimum primum moritur æger. Quinimo per spatium illud omne, quod inter dies undecimum, & decimum Septimum interjacet, appetente vespérâ, molestissimo inquietudinis

etudinis paroxysmo, quotidie vexatur æger.

Mittatur sanguis quovis ex tribus primis diebus ab invasione ad $\mathfrak{z}x$. vel x . & postea Vomitorium exhibeatur ad $\mathfrak{z}j$. vel $\mathfrak{z}i\mathfrak{s}$. Infusionis Croci Metallorum

His primis diebus diluatur sanguis frequentiori potatione Cerevisiæ tenuis Lupulatae. Cui Vitrioli Spiritus immisceatur usque ad plenam pustularum eruptionem.

Cum variolæ omnes eruperint (quod ut plurimum est sexto die post invasionem) vespere propinetur Syr. de Mecon. $\mathfrak{z}j$. quæ repetatur deinceps singulis noctibus ad diem decimum post invasionem. Eâ nocte, si Variolæ & Confluentium genere fuerint, augeatur dosi ad $\mathfrak{z}i\mathfrak{s}$. quæ dein repetatur ad $\mathfrak{z}j$. manè, & ad $\mathfrak{z}i\mathfrak{s}$. serò, singulis noctibus, donec æger convalescat.

Si Syr. de Mecon. minus congruat, substitui possit Laudan. Liquid. viz. gutt. $xviii$. pro $\mathfrak{z}j$. Syrupi \mathfrak{C} gutt. xxv . pro $\mathfrak{z}i\mathfrak{s}$. Hoc interim observandum, quod si paregoricum bis in die exhibitum orgasmum compescere non valeat (quod in Variolis insigniter confluentibus, sub finem earum sæpe accidit) tum 8^a quoque hora exhibendum, vel sæpius, si opus fuerit.

At si variolæ Interstrictæ fuerint, satis erit, ut solummodo singulis noctibus post plenam eruptionem exhibeatur Paregoricum, atque etiam in minori dosi.

Quæ

Qualicumq; autem generis variolæ fuerint, atq; etiam qualcunq; morbi tempore, si Phrenitis acciderit, omnino oportet ut inordinato spirituum motui frænum injiciatur, ac proinde si prior Paregorici dosis metam non attingat, alia atq; alia assumatur, donec tumultus penitus compescatur, interposito inter singulas doses spatio aliquo; ut pernoscere valeamus, utrum dosis ultima id, quod quærimus, præstiterit, antequam nova ingeratur.

Si omnimoda urinæ suppressio acciderit, æger è lecto eximatur, & aliquantulum obambulet.

Si saliva ob calorem sit adeo viscida, ut expectorari non possit, tum Gargarisma cum Syringa sæpe in fauces injiciatur. Componatur è Cerevisia tenui vel aq. bord. cum Melle Rosarum; vel sequens usurpari poterit.

℞ Cort. Ulm. ʒvj. rad. Glycyrrhiz. ʒss. Passul. enucleat. N° xx. ros. rub. p. ʒj. coq. s. q. aq. ad ʒiʒ. in Colatur. dissolv. oxymel. simp. & mell. Rosar. an ʒij. M. f. Gargarisma.

Si epispastico opus fuerit, amplum satis & acre nuchæ applicetur nocte istâ, quæ magnam morbi crisin præcedit, mox ab assumpto paregorico, plantis quoq; pedum applicari potest allium, à die octavo, usque ad morbi finem, singulis diebus renovandum.

Si

Si Infans de Symptomatis, dentitionem comitantibus, jam securus, derepente ipfimo corripitur hic cogitandum est, convulsionem istam, fortassis à naturæ conatu, quæ variolas, scarlatinam Febrem, aut morbillos, in corporis habitum protrudere saggit, pendere; applicetur itaq; Emplastr. Epilpasticum nucha, lecto quamprimum committatur reger, exhibeatur insuper cardiacum, cui paregorici pauxillum est admiscendum, puero nempe trienni *Laud. Liquid. gut. v. in aq. Epidem. cochl. j.*

Si die undecima, vel alio quovis post eum, febris secundaria cum inquietudine, jactatione, & cæteris id genus symptomatis, usq; adeò efferatur, ut Paregoricis utcumq; repetitis sufflamini nequeat, & mors quasi immineat, tum sanguis ad satis magnam quantitatem illicò detrahatur, nempe ad xxxj . vel circiter, atq; porro repeti possit semel vel bis in sequentib. diebus, si symptomatum dictorum ratio idem postulârit; at non aliàs. Catharsis etiam blanda die decimo tertio (non antea) vel quovis alio die eum insequente (modo Venæsectio præcesserit) institui possit, nempe ex *Eleſtuarii Lenitiv. ʒj. dissolut. in aq. Cichor. vel. lactis Alexeter. ʒiij.* Veruntamen nec Venæsectio nec Catharsis impediunt, quo minus Paregorica in usum veniant, quæ, (haud obstantibus iis) tam quoad largam dosin quàm repetitam exhiberi

exhiberi debent, si opus adhuc fuerit: nam ad hæc in hoc morbo semper confugiendum.

Quando Pustulæ perfectè exaruerint, iungatur facies Linimento ex æqualib. partib. *ol. Amygd. dulc. & Pomat.* per biduum; at non ultra.

Die *xxj.* post invasionem mittatur sanguis è brachio; & sequenti die Catharsis celebranda, quæ porò alternis diebus ad tres alias vices repetatur.

Quoad Regimen; è lecto abstineat ad sextum diem post invasionem, in quo postea se contineat usq; ad *xxij.* non aliis stragulis lectus, quam quibus sanus uti solebat.

Jusculis Avenac. hordeac. Pomis coct. & Cerevisiâ tenui victnet, & post undecimum diem vini Hispanic. Cochl. *iv.* vel. *v.* bis in die exhibeantur, si æger voluerit.

Si crurum tumor non evacuationibus præscript. cedat, tum fetu fol. Malv. verbasc. Sambuc. Lauri, cum floribus Camæmel. & Melilot. in lacte coct. facile fugatur.

Si primis morbi diebus æger Hæmoptoë labores, vel urinam reddat sanguineam, tum pulvis & tinctura, quæ in capite de Hæmoptoë præscribuntur, sextâ quâq; horâ (donec symptomata ista prorsus cessaverint) diligenter exhibeantur. Quo etiam casu Paregorica liberali manu propinanda.

De chorea Sancti Viri.

Convulsionis species quædam est, pueros puellâve à decimo ætatis anno ad pubertatem invadit, prodit se claudicatione, vel instabilitate alterutrius cruris, quod æger post se trahit satuorum more; manum ejusdem lateris, vel pectori vel alii alieni parvi applicitam, nequit continere in eodem situ horæ momento, sed in alium situm & locum convulsione distorquebitur, quicquid æger contra nitatur. Antequam poculum ad os posset adducere, mille gesticulationes, circulatorum instar, exhibebit: Non enim rectâ lineâ ori admoveat, sed deductâ à spasmō manu, huc illuc aliquandiu versat, donec tandem fortè fortuna labris propius apponens liquorem derepentè in os injicit, & avidè haurit; deditâ tanquam operâ, ut spectantibus risum moveret.

Sanguis ad ʒviij . plus minus, pro ætate ex brachio educatur.

Die sequenti, dimidia pars, vel quiddam amplius, pro ratione ætatis, potionis commun. hauriatur; & vesperi haustulus sequens propinetur.

R. Aq. Cerasor. nigr. ʒj. aq. Epilept. Langii ʒij. Theriac. Andromach. ʒj. Laudan. Liquid. gut. viij. f. haustus.

Potio

Potio Cathartica ad tres vices, alternis diebus, repetatur; & *haustus Purgatorius* iisdem noctibus.

Postea Sanguis iterum extrahatur; & ad Cathartica, uti prius, æger revertatur, & sic sanguis mittatur, & alvus subducatur ad tertiam quartamve vicem; spatio tamen inter alternas evacuationes observato, ut nihil periculi ægro imminear.

Diebus à purgatione vacuis sequentia præscribantur.

R. Consero. Absinth. Roman. & Flavet. Aurantior. an. ʒj. Consero. Ambros. ʒss. Theriac. Andromach. vet. & nuc. moschat. condit. an. ʒiiij. Zinzib. condit. ʒj. Syr. è succ. citr. q. s. f. Electuar. de quo capiat ad magnitud. nuc. moschat. manè & horâ quintâ pomeridianâ, superbibend. vini sequentis Cochlear. v.

R. Rad. Pæonia, Enul. Campan. Imperator. & Angelic. an. ʒj. fol. Rut. Salu. Batonic. Chamædr. Marrub. alb. & summitat. Centaur. min. an. Mj. Baccar. Juniper. ʒvj. Cortic. duor. Aurantior. Incidantur & infundantur frigide in vini Canarini ʒvj. Coletur tantummodo usûs tempore.

R. Aq. Rut. ʒiv. aq. Epilept. Lang. & Bryon. comp. an. ʒj. Syr. Pæon. ʒvj. M. f. Julap. cap.

cap. Cochl. iv. singulis noctibus cubitum iturus, instillando *Sp. C. C. gut. viij.*

Applicetur plantis pedum Emplast. & Carranna.

Ob Recidivæ metum pertundatur ei vena, & ad dies aliquot purgetur, eâ ipsâ anni sequentis tempestate (vel paulo ante) quâ morbus invasit.

Verisimile mihi videtur, quod hæc methodus curationi Epilepsiæ Adultorum convenire possit, quod tamen non adhuc expertus sum. Cum verò Chorea *Viri* ætates teneras adoriri soleat, in Epilepsia Adultorum tam sanguinis detrahendi quantitas, quam Catharticorum dosis adaugeantur.

De Apoplexia.

Somnus est profundissimus, & omnimodæ sensus & motus privatio, exceptâ respiratione, quam ægri habent difficilem cum stertore.

Mittatur Sanguis è brachio ad xxij . quantum primum, ac postea ex venis jugularibus ad viij . deinde Vomitorium ex ziss . vel zij . *Infus. Croc. Metal.* propinetur statim.

Emplast. Epispastic. satis amplum ac forte cervici applicetur.

Dum hæc aguntur, erectus sedeat æger in lecta, nec stragulis nimis obrutus.

Sp. Sal. Armoniac. optimè rectificatus admoveatur naribus.

Finitâ

Finitâ Vomitorii Operatione, subinde exhibeantur Cochls, iij. vel iv. sequentis Julapii.

Rx Aq. Rutæ ʒiv. aq. Bryon compos. ℥ Antiepilept. Lang. an. ʒj. Sp. C. C. gut. xx. Sacchar. Crystal. q. s. f. Julap.

Vel Cochleare j. Sp. Lavendulæ compos. per se propinari possit bis vel ter, durante paroxysmo, horâ dimidiâ vel integrâ interpositâ.

Cavendum est, ne Cardiacâ plus justo calida, ac nimis frequenter (uti mos est) exhibeantur; nam quacumq; dènum specificâ virtute pollere videantur, plus damni quam emolumenti ægro apportant, utpote quæ humores fundere (ac proinde malum augere) apta nata sunt: quod etiam incommodum non minus inferitur ex nimia stragulorum congestione.

Paroxysmo jam finito, ad præcavendam recidivam sequentia exhibeantur.

Rx Pil. Coch. maj. ʒij. cap. terciâ quaq; diē per 6 vices horâ 4^a marurinâ, superdormiendo.

Rx Conserv. flor. salv. Rosismarin. an. ʒj. Conserv. flaved. Aurant. ʒvj. nuc moschat. condit. ℥ Zinzib. oondit. an. ʒss. Theriac. Androm. vet. ʒij. pulv. elect. diamb. diamosch. dusc. an. ʒj cum s. q. Syr. conditur. citr. f. opiata

opiatā, capiat ad magnitudinem Castaneæ
manè & serò, superbibend. aq. Epilept. Lang.
Coch. ij.

℞ Ambr. grise. 3℔. ol. destil. sem. Anisi,
cinnamom nuc. moschar. an. gut. ij. ol. Car-
phyl. gut. j. Sacchar. in aq. flor aurantiar.
solus. ʒiv. f. s. a Tabella, quarum capiat u-
nam ad libitum.

Ab usu potus generosioris cuiusvis sibi tem-
peret, vescatur iusculis avenaceis; hordea-
ceis, ut & ex pullis gallinaceis confectis, &
quandoq; etiam (præcipue inter purgandum)
carne pullorum agnorum ac id genus cibo-
rum eupepton.

De Ophthalmia.

Ex oculorum inflammatione pater.

Mittatur Sanguis è brachio ad ʒx. Se-
quenti die sumat potionem purgativam com-
munem, quæ repetenda est per duas alias vi-
ces, duobus diebus interpositis; iisdem no-
ctibus sumat haustum paregoricum ex Syr. de
Mecon. ʒj.

Diebus à purgatione vacuis sumat ter aut
quater in die ʒiv. Emulsionis ex sem. frigid.
maj. ℞ Papav. alb.

℞ Aq. Plantag. Ros. rubr. ℞ Spermat.
Ranar. an. ʒj. pulv. Tutie preparat. ʒj. f. Col-
lyrium, cujus guttæ aliquot instillantur oculis
bis

bis in die ; at non incipiendum, nisi post primam purgationem.

Si his remediis affectus haud cedat, repetatur Venæsectio semel vel bis, (præcipue si sanguis Pleuriticus apparuerit) ut etiam Catharsis.

Abstineat ab usu vini & cujusvis liquoris generosi, ab usu etiam ciborum coctum difficultum, & sale conditorum ; & diebus inter purgationes bibat hydrogalam coctam.

Nota, quod sæpè accidit, quod Venæsectioni & Catharsi utrunq; repetitis Ophthalmia non cedit ; hoc in castu *Paragoric. ex Syr. de Mecon.* ꝑj. singulis noctibus exhibitum, curationem sine aliorum suppetiis absolvit.

De Uteri Procidentia.

℞ *Cort. Querc.* ʒij. *Coq. in Aq. font. hlv.* ad ʒij. *sub finem addendo Cortic. Granator. contus.* ʒi. *ros. rubr. flor. Granator. an.* Mj. *dein adde vini rubr.* ℥ss. Colatura sit pro soru, qui cum pannis laneis parti affectæ admoveatur manè horis duabus, antequam è lecto assurgat, & nocte post decubitum, donec symptoma penitus evanuerit.

De Paroxysmo Nephritico.

Ad sunt dolor fixus in lumborum regione, urina cruenta, arenularum aut calculi excretio, stupor cruris & directo tenis, laborantis, testis retractio ejus lateris, in quo

D

est

est dolor, nausea & vomitus. Dolor colicus nephritico haud absumilis; licet in quibusdam symptomatis planè discrepet, quæ recensita in *Capite de Colica biliosa* videas.

Si Æger temperamento sanguineo fuerit, mittatur sanguis è brachio affecto reni respondententi ad *æx.* dein liquoris possetici cui *Rad. Althææ ʒij. incoctæ fuerint Cong. j.* quam citissime deglutiatur; & Enema sequens injiciatur.

Rx Rad. Althææ & Lilior. an. ʒi. fol. Malo. Parietar. Branc. Ursin. & flor. Chamemel. an. M. j. Sem. Lini & Fœnygr. an. ʒß. coq. f. q. aq. ad ʒiiss. M. F. Enema. Rejectis Vomitorio & Enemate. Laudan. Liquid. satis magna dosi propinetur, viz. ad gutt. xxv. vel Pil. Matth. gr. xv. vel xvj. In senibus vero, & morbo diuturno fractis, ut & vetulis Vaporibus obnoxiiis (præcipuè si sub initium Paroxyfmi urinam eæ reddant nigram & sabulosam) Venæsectio omitatur; at quoad reliqua, eadem quæ dicta est viâ omnino procedendum.

In mictu Sanguineo à calculo renibus impacto.

Capiat æger, statò quodam die, singulis hebdomadis, *Manne ʒiiss. in seri lactis ʒij.* solut.

Conducit aliquando, haustus cerevisiæ tenuis liberalior.

In

In calculo renum grandiori, dolor hebes, & obrusus, nullatenus auctus, sed satis tolerabilis persentitur, nec paroxysmus nephriticus comitatur.

Aquis chalybeatis æger se non tutò committer, nisi prius certò sciat, calculum majorem non esse, quam ut per ureteres viam possit invenire, quod, hoc tantum modo, certò potest dignosci, si nempe, jam antea, paroxysmum aliquem nephriticum fuerit perpeßus, (cum dolore scilicet sævissimo in renum alterutro, per ureterum ductus propagato, & vomitu enormi) pro comperto habeat, non tam grandiore aliquem calculum pelvi concludi, quam lapillorum exiguorum congeriem, quorum unus subindè in ureterem illabitur atque ita paroxysmum invitat, qui fere non desinit, nisi calculo in vesicam detruso, cum sic se res habeat, nullum est magis efficax remedium, quam aquarum chalybeatarum potatio; quod si calculosus, nullo unquam paroxysmo nephritico, fuerit tentatus, cum jam major sit calculus, quam qui ex pelvi possit elabi, devitandæ sunt aquæ ferreæ.

De Dysenteria, Diarrhæa & Tenesmo.

Rigent horrentque, sequitur deinde rotius corporis calor, quem brevi excipiunt ventris tormina, & hæc, dejectiones crebræ, & mucosæ omnes (nisi quòd stercorosæ nonnun-

quam interponantur) cum ingenti cruciatu & molestissimo viscerum omnium quasi descensu, quoties exoneratur alvus, sanguinis interim lineamentis intertextæ, licet aliquando ac minimum sanguinis per totum morbi decursum admisceatur. Progressu morbi sanguis sincerus quandoque excernitur, & gangrænâ insanabili afficiuntur intestina. Si æger ætate floreat, vel cardiacis incalescat. Febricitat admodum, lingua est subalbida, quadam mucilagine densè obsita, interdum nigra & sicca. Prosternuntur vires, dissipantur spiritus, aphthæ insuper oris interna faucibusque obsident, præsertim ubi materiæ peccantis evacuatio adstringentibus præpoterè impeditur, non exacto per cathartica morbi fomite. Aliquando, exulante febre, agmen ducunt tormina, & cætera morbi symptomata sequuntur.

In diarrhœa humores excrementitii sine sanguine aut intestinorum exulceratione excernuntur.

In tenesmo assidua est desidendi cupiditas, nihil tamen præter mucosum quoddam & subcruentum aut purulentum rejicitur.

Mittatur sanguis è brachio quamprimum, eademque nocte Purgoricum propinetur; & mane sequenti *Potio purgans communis*, repetenda alternis diebus ad duas alias vices, & Purgoricæ post Purgationes quamprimum suo defunctæ sunt munere; ac diebus à purgatione

tionem vacuis idem mandè & serò est exhibendum.

Post Venæsectionem & Catharsin semel celebratam, per totum morbi decursum, sequens Cardiacum exhibeatur.

Rx Aq. Ceras. nigr. & fragor. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. Aq. Epidem. Scord. comp. & Cinam. hordeat. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. Margarit. præparat. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{s}$. Sacchar. crystal. q. s. adde Aq. Rosar. Damascen. $\mathfrak{z}\mathfrak{s}$. ad gratum saporem, m. f. Zulap. de quo cap. cochl. \mathfrak{v} . vel \mathfrak{v} , in languoribus, vel ad libitum.

Potus sit Lac coctum cum Aq. Triplo, vel Decoct. Alb. ut,

Rx C. C. C. & Mic. panis alb. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. cogn. in. Aq. font. $\mathfrak{v}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$, ad $\mathfrak{v}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. postea s. q. Sacchar. Albiss. edulcoretur. Vel si dejectio virium postulaverit, Aq. font. $\mathfrak{v}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. cum Vin. Canarin. $\mathfrak{v}\mathfrak{i}\mathfrak{s}$. simul coctæ, pro potu frigide assumantur.

Cum per tres vices purgatus fuerit æger, tota curatio usui Laudani bis vel ter in die repetiti postea incumbit, nisi quod Enemæ ex Lañ. vaccin. $\mathfrak{v}\mathfrak{i}\mathfrak{s}$. & Theriac. Androm. $\mathfrak{v}\mathfrak{i}\mathfrak{s}$. subinde injiciatur, quod in alvi egestionibus mire confert.

Cum alvi fluxus in Diarrhœam tantum assurgat, Phlebotom. & Catharsi præscript. omisiss, sequ. Bolus singulis matutinis exhibeatur.

R̄ *Rhabarb. pulv.* ʒss. (*plus minus prorati-
one virium*) cum *f. q. Diascordii f. Bolus*, ad-
dendo *Ol. c̄hym. cinnam. gutt. ij.*

Noctibus insequentibus *Paregoric. ex Aq.
cinnam. hordeat ʒi. & Laudan. Liquid. gutt.
xiv. exhibeatur.*

Ubi tormina sicca sine dejectionibus ex-
cruciant, curantur diluendo sero lactis frigide
propinato, & tepide injecto ; ut in Cholera
morbo pullorum jusculo aut lacte cerevi-
fiato.

Si hic morbus diutius excurrat, adeò ut
omnis ejus vis in rectum intestinum decum-
bat, cum assidua desidendi cupiditate. Di-
æta Analeptica instituitur, & liquor aliquis
Cardiacus pro libitu ingeratur, ut restaurari
possint vires, quibus redeuntibus, Tenesmus
sponte se proripit.

In dysenteria malè curata dolores aliquan-
do ægrum ad annos aliquot discruciant, in
hoc casu Phlebotomia repetita pristinam sa-
nitatem restituet.

Notandum est, quòd in constitutionibus
huic morbo minus faventib. omnis evacu-
ationibus dysenteria Laudano solo sanatur,
quod manè & serò repetendum, donec sym-
ptomata penitus evanuerint, vel etiam ter
Nycthemeri spatio, si opus fuerit.

De Colica biliosa.

Intestinorum dolor atrocissimus est, per horas aliquot affligit febris in hunc morbum desinens, qui aut quasi injectâ fasciâ constringit, aut in punctum contractus quasi terebello perforat; subinde remittitur, mox recrudescit. Sub initio non ita certò ad unum aliquod punctum determinatur, neq; tam crebra vomituritio, neq; alvus ita pertinaciter catharticorum vim eludit; quo autem magis augetur dolor, eo obstinatius in puncto figitur, vomituritio frequentior, & major alvi adstrictio, colicâ tandem in iliacam transeunte. A nephritide sic distinguitur. 1. Dolor nephriticus fixus in rene est, & ab eo ad testem exporrigitur secundum longitudinem ureteris. Colicus verò vagus est, & cinguli instar medium ventrem affligit. 2. A pastu colicus dolor augetur: Nephriticus potius imminuitur. 3. In colico dolore, ab excretionem per alvum & per vomitum majus levamen emergit, quàm in nephritico. 4. In dolore nephritico urina primum clara & tenuis, postea aliquid subsidet, & tandem arenulæ aut lapilli excernuntur: In colica urinæ ab initio crassiores existunt.

Sanguis è brachio paulò liberalius educatur, & post horas *iiij.* vel *iv.* *Anodyn.* exhibeatur, Postero die *Catharticum Lenitiv.* & interposito die uno, ad tertiam vicem propinetur.

At si malum hoc fructibus horariis, vel aliis cibis avidè ingestis, originem debeat, tum ventriculus ante omnia lacte cerevisiato affatim hausto eluendus est; quo exantlato Anodynum propinandum est; sequenti autem die vena secanda est, & in ordine præscripto procedendum.

Ubi hic morbus minis peritè tractatus ditissimè fatigaverit, & ægrum penè confecerit, liberalior sive aquæ Epidem. sive Mirab. sive aliis cujuscunque, qua sanus maximè delectabatur, usus, ægrum hoc tempore ultra spem omnem juvit.

De cholera Morbo.

Intra Augusti limites se continens, vix in priores Septembris hebdomas evagatur. A crapula & ingluvie excitatus similis affectus, nullo temporis discrimine insurgit, qui licet eodem curetur modo, alterius tamen est subfellii. Adhuc vomitus enorres, ac pravorum humorum cum maxima difficultate & angustia per alvum dejectio; ventris ac intestinorum dolor vehemens, inflatio & distentio; cardialgia, sitis; pulsus celer ac frequens, parvus & inaequalis; æstus & anxietas, nausea molestissima, sudor, crurum & brachiorum contractura, animi deliquium, partium extremarum frigiditas, & similia, quæ ægrum in 24 horarum spatio interimant.

Pullus tenerior in tribus circiter Aq. font. Congiis elixetur, ut carnis saporem vix perceptibilem liquor referat, hujus decocti vel (defectu ejus) liquoris possetrici capaciores aliquot cyathos æger repide exhauriat; & eodem tempore ex eodem liquore *Enemata* successivè repetenda. *Haustibus & Clysteribus Syr. Lactuc. Violar. Portulac. Nymph. eorumve* alicujus uncia subinde admisceri poterit.

Exantlato hoc Eluvionis penso (quod *iii.* vel *iv.* horas sibi vendicat) *Paregoricum* curationi Coronidem imponit.

Si non accesserit medicus, nisi postquam æger vomitu & dejectionibus per multas horas continuatis fuerit exhaustus, & jam frigescant membrorum extrema, tum ad *Laudanum Liquidum* confugiendum est in paulò majori dosi, (viz. *Laudan. liquid. gust. xxv. in Aq. cinnam. fort. 3i.*) & cum cessaverint symptomata, nihilominus manè & serò quotidie est repetendum; at in minori dosi, donec pristinas vires receperit.

Est species quædam cholerae morbi infantibus valde familiaris, ac sæpenumerò funesta, ex Dentitione vel Crapula originem ducens.

Horum ætas tenella minimè fert, ut diluatur ventriculus largâ liquorum potatione, multo minùs ut Catharticis tumultus major in humoribus excitetur, sed Curationem *Lau-*

dano solo aggredi oportet ; quamobrem
gutt. *ij*, *iiij*, vel *iv*, vel *plures*, pro ratione
ætatis, Cochlear. *j*. cerevisiæ tenuis vel Aquæ
cujusvis appropriatæ instillatæ exhibeantur,
repetanturque, ut opus fuerit.

De colica Piltorum.

Est species quædam Colicæ, quæ degenerare solet in Paralyfin, & motûs omnimodam manuum ac pedum depravationem ; quam hoc nomine *Riverius* in capite de Paralyfi indigitat, & apud insulas Caribum notissima est ; utpote, quæ magnam vim hominum infestat.

Hunc dolorem atrocissimum sanat *Balsam. Peruv.* frequenter ac in magna dosi exhibitum, nempe si ejus gutt. *xx*, *xxx*, vel *xl*. Sacchar. Albiss. cochl. *j*. instillentur, & bis vel ter in die Centur ; at Paralysis huic remedio haud cedit.

De illius Passione.

Peristalticus intestinorum motus invertitur, propinata cathartica & injecta enemata in emetica statim transeunt, alvi fæces per vomitum rejiciuntur.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad *zix*, vel *x*. post aliquot horas exhibeatur sequens Pulvis.

℞ *Resin. Scammon. vel (defectu ejus) Resin. Falap. gr. xij. Calomelan, Torquet. ʒi. m. f.*
Pulvis ;

Pillvæ ; cap. è *Cochl. i. lactis vaccini*, superbibendo ejusdem lactis *Cochl. j.* vel alterum, vel si forma *Pilularum* magis arrideat :

℞ *Pil. ex duob. 3ß. Calomet. Torquet. ʒj. cum s. q. Balsam. Peruv. f. Pil. iv. sumend. è Cochl. j. Syr. Violarum.*

Sin autem æger hoc remedium per os rejecerit, *Laudan. Liquid. gutt. xxv. Aq. Cinnamon. fort. 3ß.* instillatæ itatim propinentur, cum vero horum usu vomiturius, ac ventris dolores, remiserint, catharticum dictum iterum exhibeatur, verum si anodynorum virtute ac vi jam penitus infractis vomiturius ac dolor iterum redierint, cathartico interim in corpore resistente, ad usum paregorici supra descripti revertendum, idemque eò usque repetendum quartâ vel sextâ quâque horâ donec intestinis quies omnino inducatur, quo quidem tempore catharticum operationem suam per sedes exeret.

Nec sanè abs re fuerit elapsâ horâ unâ, aut alterâ, post *Venæsectionem*, clysterem aliquem, ex iis qui potentiùs operantur, injicere, fumum scilicet *nicotianæ*, ex tubulo inverso, per vesicam majusculam, in intestina validissimè insufflatum, quæ quidem operatio post aliquot horas reiterari debet, nisi citius meatus deorsum pateat,

Finita operatione Cathartici, sumat sequentem haustum.

Rx Aq. Cinnam. fort. ʒi. Laudan. Liquid. gutt. xxv. m. f. Haustus, qui porrò rependendus est bis, ter, vel sæpius in die, donec vomituritio & dolor penitus cessaverint; atq; etiam, istis symptomatis cessantibus, nihilominus ad curationem confirmandam per aliquot adhuc noctes capiat idem paregoricum in minori dosi cabitum iturus.

De Fluxu Mensium immodico.

Menstruorum fluxus, naturaliter constitutus, capacitatem testæ ovi anserini implet. Patet autem immodicus ex difficili tolerantia, virium lapsu, inappetentia, cachexia, colore cadaveroso, & pedum intumescencia.

Mittatur sanguis è brachio ad ʒviij. sequenti manè sumatur *potio purgativa communis*, repetaturque alternis diebus ad duas alias vices; & noctibus post purgationem *Paregoric. è Syr. de Mecon.* exhibeatur.

Diebus à purgatione vacuis sumat sequentia.

Rx Conserv. Rosar. sicc. ʒij. Trochisc. de terra Lemnia ʒiʒs. Cort. Granator. Corall. rub. præparat. ʒboli Armen. an. ʒij. lapid. hematit. Sanguin. Dracon. an. ʒj. cum f. q. Syr. Cydonior. f. Elect. de quo sumat ad magnitudinem

nam nucis moschar. maj. manè & horâ quintâ pomeridianâ, superbibendo sequentis Julapii Cochl. vj.

R \mathcal{L} Aq. Germin. Querc. & Plantag. an. \mathfrak{z} ij. Aq. Cinnamom. bordeat; & Syr. de Rosis siccis an. \mathfrak{z} i. Sp. Vitriol. q. s. ad gratiam aciditatem.

R \mathcal{L} Fol. Plantag. & Urtic. an. q. s. Contundantur simul, & succus exprimatur, & postea clarificetur, de quo cap. Cochl. iv, vel v. sæpiusculè ad libitum.

Post primam purgationem applicetur emplastr. seq. regioni Lumborum.

R \mathcal{L} Emplast. de Minio & ad Herniam an. part. æq. extendantur super alutam, f. Emplastrum regioni Lumborum admovendum.

De Colica hysterica.

Est species quædam, seu potius insigne ac valdè usitatum affectionis hystericæ symptoma, cui comitem se adjungit dolor circa scrobiculum Cordis atrocissimus, uti etiam humorum viridi colore per vomitionem ejectio.

Primo, quò Saburra vitiosorum humorum in ventriculo contentorum minùs impediatur Paregorici efficaciam, satis magna quantitas liquoris possetrici affatim ingurgitetur, atque iterum

itèrum per vomitionem reiciatur, nempe
ejusdem liquoris Cong. iss, quo peracto Laudan.
Liquid. gutt. xxv. in Aq. cinnam. fort. Aq.
Epidem. vel alius vehiculi zi. propinentur.

In usu Paregoric. hoc notandum, quòd
 eò usque repetendum est, donec symptoma-
 ta omnia penitus cessaverint, debicū interea
 tempus interjiciendo; ut dijudicare valea-
 mus, quid prior dosis effecit, antequam no-
 vam ingeramus.

Si sanguineo temperamento præditus sit
 æger, vel si antea hoc symptomate haud mul-
 tum infestatus fuerit ac viribus fractus, hoc
 in casu sanguis primùm è brachio detrahen-
 dus antequam vomitorium præscriptum pro-
 pinetur.

Hâc ipsâ Methodo Clavus hystericus cu-
 ratur. Sin verò Colica Hysterica diutur-
 nior fuerit per Paroxysmos affligens: tum
 in eorum intervallis, sive extra Paroxysmum,
 seq. usurpentur.

℞ Zedoar. subtiliss. pulv. ʒj. cum s. q. Syr.
 è conditur. citri, s. Bolus, sumendus manè &
 serò per xxx dies, superbibendo sequentem
 infusionem.

℞ Zedoar. incis. minutim. ʒß. vini Canar.
 ʒiv. infundantur frigide per xij. horas; deinde
 colentur pro usu; vel Balsam Peruv. ut in
 Colica Pictonum, usurpetur.

Quæ

Quæ de Colica Hysterica hîc dicuntur, de Colica etiam hypochondriaca dicta sunt; ut & hoc diligenter advertendum.

Utriusque affectûs natura sibi vindicare videtur, ut alia atque alia tententur, donec tandem ad illud remedium perventum fuerit, cui quasi genuinè morbus cedit; tamen si ut plurimum Chalybs imprimis confert.

Colica Hysterica tam in hypochondriacis, quam hystericis sæpissime in icterum desinit, qui sensim sponte suâ facessit, sin autem longas moras nectat, exhibeatur Apozema sequens.

R. Rad. Rub. Tinctur. curcum. an. ʒi. chelidon. maj. cum toto ꝑ summitat. centaur. min. an. M. j. coq. in Equalib. partibus Vini Rhenani ꝑ Aq. fontan. ad ℥ij. colatur. dissolv. Syr. de 5 radicibus ʒij. m. f. Apozema, de quo capiat ℥ss. calidè manè & serò, usque dum convaluerit.

De Ictero, colicâ neuti quam prægressâ.

Color flavus in toto corpore, præsertim in oculorum albis est conspicuus, quo quidem colore objecta omnia apparent affectis tincta, corporis pruritus, segnities, & lassitudo, linguæ amaror, vomitus biliosus interdum, singultus, egestio alba, urina crocea & panum immersum eodem colore inficiens, morbum indignant.

Ex-

Exhibeatur potio purgativa communis, dein aggrediatur usum sequentium ; & durante eorundem usu, Catharticum præscriptum quarto quoque die exhibeatur.

Rx Conserv. Absinth. Rom. conserv. flaved. Aurant. an. ʒi. Angelic. condit. nuc. moschat. condit. pulv. Ari compos. & chalyb. cum aceto preparat. an. ʒss. Extract. centaur. min. Extract. Gentian. & cremor. Tartar. an. ʒij. croc. Anglic. pulv. ʒss. cum s. q. Syr. de 5 radicibus f. Electuarium, de quo cap. ad magnitud. nuc. moschat. manè & horâ quinta pomeridianâ (vel vice Electuarii sumat pilulas chalybeatas) superbibendo post matutinam dosin aquarum mineralium purgantium t̄iv. & post pomeridianam dosin Apozemat. in colica hysterica descript. t̄ss.

At si signa hydropis affuerint, tam manè quàm serò apozema superbibat.

Si vel his diu continuatis morbus adhuc obstiterit, ad aquas ferreas eundem est, quæ ex ipso fonte sunt bibendæ.

Ad præcavendum abortum.

Eadem præscribenda, ac in Fluxu mensium immodico, omittis solummodò catharsis & succis.

De immodico lochiorum fluxu.

Fluxum lochiorum naturalem tria constituunt, sanguis scilicet purus, copiosus, per tri-

triduum primum fluens ; dehinc sanguis aquosus, loturæ carniū crassiori similis, per quatrīdūm præter propter durans ; hinc postmodum materia viscosa & mucilagīnosa, paucō aut nullo sanguine permīsta, per quinque aut septem dies prodiens, & sic porro ad mensis finem.

Fluxus autem eorū immodicus dijudicandus est ex viriū dejectione, animi deliquio, sanguine grumoso effluente, cibi fastidio, dolore in hypochondriis, ventris tensione, pulsū debili & frequenti, visus obtenebratione, aurium tinnitu, & convulsionibus.

Victus incrassans instituatūr, & porus sequens addatur.

℞ *Aq. Plantag. vin. rubr. an. ℥ij. coq. simul ad terrias, & deinde edulcoratur s. q. sacchar. albiss. cujus, cum frigescat, cap. ℥ss. bis vel ter in die.*

Interim Julap. aliquod Hystericum (at farris mite) subinde propinetur, & nodulus sequens naribus applicetur.

℞ *Galban. Asæ fœtid. an. ℥ij. castor. ℥iss. sal. succin. volatīl. ℥ss. m. f. nodulus, vel*

℞ *Sp. salis Ammoniac. ℥ij. quem saepe olfaciat.*

De suppressione Lochiorum.

Intumescit venter, dolor gravativus inum ventrem, lumbos & inguina occupat, facies

ru-

rubescit, difficilis est respiratio, perturbantur oculi, rigores, febres acutæ adsunt, animi deliquia, sudores frigidi, pulsationis & ardoris sensus in utero, paralysis in partibus inferioribus, ut & interdum epilepsia.

E vestigio lecto addicatur, & *Emplast. hystericum* umbilico admoveatur quamprimum, *Elect. seq.* adhibeatur.

Rx Conserv. Absinth. Rom. Rut. an. ʒi. Trochisc. è Myrrh. ʒij. Castor. croc. Anglic. sal. volatib. Sal Armoniac. ʒ. Asæ fœtid. an. ʒss. cum s. q. Syr. è 5 radicib. f. Elect. cap. ad magnitud. nuc. moschar. quartâ quâq; horâ, superbibendo seq. Julap. Cochl. 4 vel 5.

Rx Aq. Rutæ ʒiv. Bryon. compos. ʒij. Sacchar. cand. q. s. f. Julap. vel sumat Trochisc. de Myrrh. ʒj. quartâ quâque horâ.

Si tota prædictorum quantitas consumatur, & Lochia adhuc suppressantur, *Laudanum* unicâ saltem vice exhibendum ut, *Laudan. Liquid. gutt. xiv. in Aq. Bryon. compos. vel Laudan. solid. gr. iß. cum Asæ fœtid. ʒss. in pilulas duas redactum.*

Si hæc nihil proficiant, tum *Enema* ex lacte Saccharato, unicâ saltem vice, injiciatur.

De Hydrope.

Foveæ à digitorum impressione in surarum parte inferiori sub noctem conspicuæ manè evanescentes hoc malum primum indicant, maximè

maximè si spiritus interim ægriùs ducatur (haud rarò tamen fæminæ prægnantes, & quibus catamenia sistuntur, ut & viri ab asthmate inveterato derepentè liberati eodem tumore tentantur) pedibus cruribúsq; ad extremum extensis, in abdomen ruunt aquæ, & ad ultimum capacitatis suæ limen paulatim distendunt, donec tandem in viscera nobiliora impetu ab iis factò æger submergitur. Pro rata qua partes à morbo obsessæ mole augmentur, aliæ magis magisq; gracilescent, urgentibus dyspnœâ, urinæ paucitate, & siti intensâ. Viros, ingravescente ætate; fœminas, ubi jam parere desierint, ut plurimum adoritur.

Indicationes curativæ dirigendæ sunt primò ad aquarum evacuationem, deindè ad instaurandum sanguinis robur; quò novus aquarum proventus præcaveri possit.

℞ Vini albi ℥iv. Falap. subtiliss. pulv. Zinzib. pulv. ℥ss. Syr. de Spin. Cervin. ℥i. M. f. Potio, sumenda summo manè, repetendâq; singulis vel alternis diebus, pro ratione virium, donec partes affectæ derumuerint; vel,

℞ Tamarind. ℥ss. fol. Senn. ℥ij. Rhei. ℥iss. Coq. in f. q. aq. ad ℥iij. in Colatur. dissolv. Mannæ & Syr. Ros. solut. an. ℥i. Syr. de Spin. cervin. ℥ss. Elect. è succ. Rosar. ℥iij. M. f. Potio, sumenda, ut supra; vel,

℞

Robur sanguinis

℞ Pil. ex duob. Sj. Elater. gr. iij. Ol. Chym. Caryophyl. gurr. ij. f. Pil. N^o iij. cap. summo mane, repetanturque, ut opus fuerit; vel,

℞ Gambugii gr. xv. vin. alb. ℥ aq. Cichor. an. ʒss. Syr. de Spin. Cervin. ʒss. m. f. Potio. sumenda ut supra; vel,

℞ Cortic. interior. Sambuc. è ligno debrasi M. iij. coq. in aq. ℥ lact. partibus æq. misturam ʒij. ad ʒij. Colaturæ capiat dimidiam partem mane, & alteram serò quotidie, donec convalescat. At hoc remedium, nisi in corporibus, quæ facillimè purgativis cedunt, nihil confert.

Circa usum Catharticorum in hoc morbo hæc tria advertenda sunt.

Primo, utrùm ægri corpus facillè an verò difficulter Catharticis cedere soleat, cum in iis qui facillè purgantur Syrup. de Spin. Cervin. solum ad ʒi. exhibitus aquas sat copiosè eliciat, in illis verò, qui difficulter purgantur, Cathartica supra descripta, utut valida, vix scopum attingant.

Secundò, Cathartica omnia, quæ segniùs operantur, magis officiant quam prosunt; quamobrem purgatio paulò fortior & nimia, iusto debiliore est præferenda.

Tertio, Aquæ eà maximà celeritate exhauriri debent quam ægri vires ferre queant: ne nimis longa inter purgationes intervalla adhibendo, aq. denuò affatim colligantur.

Est

Est autem ubi medicamenta omnia, quæ-
 liscunq; demum generis, quæ alvum movent,
 prorsus omitti possint ac debeant; quoties
 enim ager constitutione est infirmiori, vel
 foemina vaporibus obnoxia, aquarum eva-
 cuatio Diureticis solum committenda, inter
 quæ ea sunt efficacissima, quæ ex salibus
 Lixivialibus fiunt; ut,

*Rx Cinerum Genistæ ℥j. infundantur frigidi
 in vini Rhenan, ℥iv. liquoris per filtrationem
 colati ℥iij. manè quintâ pomeridianâ & serò
 singulis diebus exhibeantur, usq; dum humor
 evanuerit.*

Aquis jam penitus evacuatis Calefacientia
 & corroborantia medicamenta usurpanda;
 ut,

*Rx Rad. Raphan. Rusticæ fol. cochl. hor-
 tens. absinth. vulgar. Salv. summitat. centaur.
 min. & Genistæ, infundantur in cerevisia fortî
 pro potu ordinario, qui porus incipienti hy-
 dropi aliquando sine Catharticis subvenit,
 vel sequent. utarur;*

*Rx Conserv. Cochl. hartenf. absinth. Roman.
 an. ʒi. Extract. Gentian. Absinth. vulgar. &
 Centaur. min. an. ʒiij. cum s. q. Syr. e cortic.
 citr. f. Eleſtuarium, de quo sumat ad quan-
 titatem nuc. moschar. maj. manè, quintâ po-
 meridianâ, & vesperi, superbibend. ʒiv. se-
 quentis infusionis.*

℞ Rad. Gentian. ℥i. summitat. Genist.
Centaur. min. ℥ Absinth. vulgar. an. M. j,
Sem. fœnicul. ℥ Petroselin. an. ℥ij. incisis mi-
nutim affunde vini Rhenani ℥iv. stent simul
in infusione frigida, & coletur solummodo
tempore usûs.

Notandum, cùm ad corroborantium usum
deventum fuerit, ægrum nullo modo esse
purgandum, tantisper dum sanguinis corro-
borationi navetur opera.

Quod & per salium Lixivialium usum
omnino observandum, quo quidem tempore
pariter corroborare convenit.

℞ Rad. Raphan. Rustican. ℥iij. fol. Cochl.
Hortens. absinth. vulg. salvie, summitat. Cen-
taur. & Genistæ, an. M. iij. Aurant. incis.
Nº iij. Infundantur in Congiis vj. Cerevisiæ
fortis non lupulatæ, inter fermentandum; sit
pro potu ordinario.

De Gonorrhœa virulenta.

Corripunt dolor genitalium insolitus, &
rotatio testiculorum, in non recutitis macula
morbilli æmula glandem occupat, statim à
cujus exortu liquor, seminis instar, extillat,
qui quotidie à seminis colore & consistentia
recedens flavescit tandem dilutius ovi vitello;
in lue virulentior virescit, & aqueo humori
permisceetur sanguine tincto. Pustula dicta
ulcus fit, aphthis infantum simile, indies
latius & profundius depascens, superveni-
ente

ente orificii callo. Verpi non glandis ulcere, solâ Gonorrhœâ tentantur. Mox magnus dolor in pene, quoties erigitur, quasi manu transversus fortiter constringeretur, noctu præcipuè urget, dum æger lecto incalescit. Curvatur penis à fræno contracto. Accedit ardor urinæ, inter mingendum vix percepribilis, sed mictu finito, per urethræ ductum acriter urens, maximè quâ in glandem desinit. Carunculæ lotii exitum quandoque impediunt; & scroti dolor ac inflammatio nonnunquam superveniunt.

Rx Mass. Pil. Coch. maj. *z*ij. Extract. Rud. *z*i. Resin. Jalap. & Diagryd. an. *z*ss. cum *℥*q. Opobalsam. f. Pilul. è singulis drachmis *vi*, cap. *iv*. singulis Auroris, donec urinæ ardor & color flavus materiæ seminiformis, admodum imminuantur. Postea alternis diebus ad septimanas adhuc duas; ac sub finem bis in septimana, donec humor stillare prorsus cessaverit.

In iis, qui difficulter purgantur, subindè intercalari possit potio communis purgativa, cui addantur, Syr. è Spin. Cérvin. & Elect. Succ. Rosar. an. *z*ij. vel, curatione minùs sæliciter succedente Turbith. Minerale ad gr. viij. exhiberi potest bis vel ter, diebus quatuor interpositis, vel vice Turbith. Mineral.

Rx

*R. Pil. ex duob. ʒss. Merc. dulc. di. cum
f. q. Opobalsam. f. Pil. in summo mane su-
menda.*

Si æger à dicta Catharsi abhorreat, post
pülulas primò descriptas, tribus Auroris con-
tinuis sumptas, tum manè & horâ quintâ
pomeridianâ quotidie injiciatur Clyster se-
quens, nisi quod semel aut bis in hebdomade,
omisso Clystere, Cathartico imperandum.

*R. Bloct. è succ. Rosar. ʒvi. Terebinth.
Venet. Vitello ovi solut. ʒss. dissolvantur in
Aq. bord. ℥i. Colatur. adde Syrup. Violar. ʒii.
M. f. Clyster.*

Singulis noctibus cap. Opobalsam. vel Bal-
sam. è Moech. gutt. xxv. Sacch. frustulo ex-
cepta. Hujus defectu Terebinth. Cypr. ad
quantitatem Avellanae substitui possit.

Sic pro potu hydrogala; ac Cerevisia re-
nuis in passibus.

Vel sequentem methodum aggrediatur.

*R. Pil. ex duob. ʒss. Opobalsam. gutt. iiii. f.
Pil. N° iiii. Cap. horâ quartâ matutinâ, su-
perdormiendo, repetanturq; alternis diebus,
vel tertiâ quâque die.*

Diebus à purgatione vacuis injiciatur manè
& horâ quintâ pomeridianâ Clyster supra de-
scriptus.

Procedente curatione (quâcunq; eâ de-
mum methodo tentetur) sanguis sub medium
cura-

curationis semel vel bis mittatur, & diæta refrigerans & incrassans præscribatur, & medicamenta iisdem virtutibus pollentia, qualia sunt *hydrogala, Emulsiones ex seminib. frigid. &c.*

Si Penis Tumore afficiatur.

℞ *Rad. Althææ, Lilior. an. ʒiʒ. fol. Malv. Verbasc. Sambuc. Hyoscyam. flor. Chamæmel. Melilot. an. M. j. sem. Lini, Fœnugrac. an. ʒʒ. coq. f. q. Aq. font. & f. forus parti affectæ admovendus per horæ unius spatium bis vel ter in die.*

Peractâ fomentatione, perungatur pars affecta ol. sem. Lin. rec. extract. dein. *Emplast. è mucilag. alutæ agninae inductum* labiis præputii tumidis circumponatur.

Si Ulcus in præputii labiis, vel in subjecta Glande, hæreat, tum sequens Linimentum præscribatur.

℞ *Unguent. Basilic. ʒvj. Unguent. Nicotian. ʒij. præcipitat. Aq. Rosar. loti & optimè levigat. ʒʒ. M. f. linimentum*, quo lintei rasura imbuatur, & ulcusculo admoveatur semper post foris præscripti usum.

Si serotum tumore afficiatur, statim sanguis è brachio extrahatur, atque bis in die forus præscriptus parti affectæ admoveatur, singul. foribus addendo *Sp. vin. Gallic. Cochl. j. vel*
E al-

alterum, vel Cataplasma ex Oxycrato & farina fabarum ejus loco applicandum.

Carharticis interim & refrigerantibus modò descriptis introsumptis utendum est.

De Lue Venerea.

Ubi aut à Gonorrhœæ mora, aut indebito astringentium usu labes sanguini imprimitur, exoritur Lues. Comparent in inguine bubones, in capite dolores & artubus, articulorum interstitiis, noctu præcipuè invadentes in lecto calidos, crustulæ & porrigines in variis corporis partibus, quæ ad instar favi flavescent. Quo magis scabies diffunditur, tanto minus æger discrucietur. In cranio, tibiis bachiusq; exostoses, osium inflammatio & caries; ulcera phagædenica in variis partibus, sed fauces ut plurimum primò aggredientia, quæ sensim per palatum in nasi cartilaginem propagata mox eam absumunt, ita ut fulcro destitutus nasus planè concidat. Ulceribus, carie & dolore indies exacerbatis, pereunt per vices membra; lacerum donec cadaver, & jam Superis grave humo condatur.

R̃ Axung. Porc. ʒij. Mercur. crud. ʒi. M. f. Linimentum, in tres æquales partes dividendum, quarum unâ brachia, crura & tibiae ad tres noctes continuas manibus suis æger perungat. Si

Si intra tres dies post ultimam inunctionem salivatio haud procedat, tam gr. viij. Turbith. mineral. in Conserv. Rosar. rubr. exhibeantur aut corporibus minus robustis, Merc. dulc. ʒj. Sed si salivatio jam incepta prius elanguescat, quàm symptomata penitus disparuerint, extimulanda subindè est eadem dosi Mercur. dulc.

Ptyalismus ita moderari debet, ut tñs. Nycthemeri spatio expuat, aut circiter.

Si justo altius exurgat Ptyalismus, cum inflammatione nimia, atq; id genus symptomatis ingruentibus, aliquantulum reprimendus est medicamentis Catharticis, donec debitum gradum attingat.

Quamprimum symptomata cessaverint, statim immutentur indusium & tori lintea; at sint ea, quæ prius usurpata fuerint.

Si Diarrhoea supervenerit (quod plerumq; accidit antequam salivatio bene assurgat) tunc sistenda est usu Laudan. Liquid. ita dosim augendo atq; repetendo, ut debitum opus absolvat.

Si os exulceretur, Aq. Ros. Damascen. vel lacte Aq. permisto, vel seq. decoct. idem coluatur.

R. Rad. Alb. Hordei mundat. an. ʒi. sem. Cydonior. ʒss. coq. f. q. aq. ad tñj. M. f. Gargarisma, quo sæpius utatur.

Diæta & reliquum ægri regimen, eadem ac in Catharsi imperanda, nisi quod primis

aliquot diebus liquore possético, jusculis
avenac. hordeac. ac cerevisiâ tenui repe-
factâ nutriatur.

His omnibus ritè peractis (etiâ si symp-
tomata omnia evanuerint, ac subindè mor-
bus penitus profligari videatur) quo minùs
recidivam postliminiò patiatur, ægro semel
in septimana per 4 vel 6 vices, *Merc. dulc* ʒj.
exhibendus, utcunq; bene se habeat, & eti-
â si jam domo egrediatur.

De Fluore albo.

Quod effluit, modò album, modò palli-
dum, flavum, viridè aut subnigrum, modò
acre & erodens, terrum quandoq; & graveo-
lens, decoloratur facies, dolet spina dorsi,
prostermitur appetentia, oculi pedèsque intum-
escunt.

Mittatur sanguis è brachio ad ʒviij.

℞ *Pil. Coch. maj.* ʒij. *Castor.* gr. ij. *Bal-
sam. Peruv. gutt.* iij. *f. Pil. N° iv.* cap. horâ
quartâ matutinâ, superdormiendo; repetan-
turq; per duas alias vices interponendo diem
unum vel alterum pro ratione virium.

℞ *Aq. Rut.* ʒiv. *Aq. Bryon. comp.* ʒij.
Sacchar. Crystall. q. s. *f. Fulapium;* Cap.
Cochl. iij, vel iv. in omni languore; deinde
aggrediatur usum sequentium.

℞ Theriac. Andromac. ʒiʒ. Conserv. flaved.
 Aurant. ʒi. Diascord. ʒʒ. Zinzib. condit. &
 nuc. moschat. condit. an. ʒiiij. Pulv. è Chel. cancr.
 comp. ʒiʒ. cort. exterior. granat. Rad. Angelic.
 Hispan. corall. rubr. preparat. & Trochisc. de
 terra Lemnia an. ʒi. Boli Armen ʒij. Gumm.
 Arabic. ʒʒ. cum s, q. Syr. de Resis siccis f.
 Electuar. de quo sumat ad magnitud. nuc.
 moschat. maj. mandè, horâ quintâ pomeridia-
 nâ, & nocte per mensem integrum, superbi-
 bendo sequent. infusionis Cochl. vj.

℞ Rad. Enul. campan. Imperator. Angelic.
 Calami Aromat. an. ʒss. fol. Absinth. Roman.
 Marrub. alb. centaur. min. Calamenth. vulgar.
 salu. sicc. an. M. j. Bac. Junip. ʒi. incidan-
 tur minutim & infundantur in Vini Canarini
 Riv. stent simul in infusione frigida, coletur
 tantummodò tempore usûs.

Vescatur cibus eupeptis, & abstineat ab
 usu olerum & fructuum qualiumcunque &
 singul. partibus bibat vinum Hispanicum.

De Diabete.

Succi sanguini illati per vias urinarias
 crudi & inconcocti exitum sibi quærunt,
 unde sensim labefactantur vires, colliquefcit
 corpus, & quasi substantia ejus per hanc clo-
 acam exinanitur, cum siti, ardore viscerum,
 lumborum coxarumq; intumescentiâ, & sa-
 livæ spumosæ expuitione crebrâ.

Eadem præscribenda sunt, quæ in fluore albo, omittis solummodò Venæsectione & Catharsi.

De Doloꝛe Hemorrhoidum.

Intensissimus inter excernendum dolor excruciat, & excrementi superficies cruore conspergitur; Nonnunquam tumores verrucis similes in sphinctere delitescent, vel in margine ani apparent.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad 3x.

*Rx Sem. Melon. Pepon. an. ʒss. sem. papav. alb. ʒij. Amygd. dulc. excoꝛticat. N^o 6 3 con-
eundantur in mortario marmoreo, sensim affun-
dend. Aq. Hord. ʒss. Aq. Rosar. ʒij. Sacchar.
albiss. q. s. f. s. a. emulsio; cap. ʒiij. sæpius-
cule.*

*Rx Flor. Sulphuris, Pulo. Glycyrrhiz.
Salvia an. ʒi, cum s. q. Balsam Lucatel.
f. Pil. e sing. drachm. vi; cap. iij, ter
in die, superbibend. Emuls. præscript:
Cochl. vi.*

*Rx Aq. Spermat. Ranar. ʒiv. in qua
dissolv. Lithargyr. ʒii. Opii ʒi; f. mixtur.
cujus tantillo Linteum madefactum parti
affectæ applicetur, vel si tumor intus lateat,
Cochl.*

Cochl. iii. ejusdem mixturæ modo Clysteris injiciantur.

Pro Potu ordinario bibat aquam cum lacte coctam, vel aquam hordei ; & à carnis usu abstineat. Singulis noctibus sumat Diacodium.

De fluxu Hemorrhoidum immodico.

Innotescit ex viribus prostratis, copia & diuturnitate sanguinis excreti, sædo corporis colore, ad citrinum (ut in ictero) vergente. Succedit cachexia, & deinde hydrops.

Eadem conferunt, quæ in fluxu mensium immodico, omisâ solummodo Catharsi.

De Epilepsia Puerorum.

Vel primo mense aggreditur à frequentibus nimis alvi dejectionibus (quod in casu *Diascordium ad quantitatem grani piperis in Aq. Saxifrag. aut lacte materno solutum*, & exhibitum præstantissimum est remedium.) Vel circa dentitionis tempus, à septimo ad decimum mensem, rufi comitata est, aut (quod multo deterius) vomitu & diarrhœâ, viridia (ut solent hystricæ) egerente infante. Quandoq; improvise occupat paroxysmus, os

oculosque distortuens, nigredine vultum perfundens, & artus varios convellens; quandoque præsentitur ex digitorum in pugnum contractione, & ex stabili & insolita oculorum orbitarum immobilitate. Nunc seriùs, nunc ocyùs se proripiunt paroxysmi, certâ subinde periodo, vago aliàs insultu reverentes; sed, appetente morte, à tergo se invicem premunt: Si quando inducias dent, in soporem proclives sunt infantes, donec à novo resuscitentur insultu.

Applicetur *Emplastr. Epispastic.* cervici quamprimum.

*Rx Aq. Epilept. Lang. ʒiij. Laudan. Li-
guld. gutt. j, vel ij, vel plures, pro ratione
ætatis, Syr. Pæon. ʒj. M. f. Haustus, su-
mendus quamprimum.*

*Rx Aq. Ruta ʒiij. Aq. Epilep. Lang. ℥
Aq. Bryon. comp. an. ʒi. Syr. caryophyll. ʒss.
M. f. Fulap. cap. Cochl. j. singulis horis, si
haustus præscript. paroxysmum non fuga-
verit.*

De Rachitide.

In Rachitide adsunt partium laxitas & mollities, debilitas & languor, ignavia & torpor, & inæqualis earundem nutritio,
viz.

vix caput iusto majus, facies plenior & floridior, partes carnosæ infra caput emaciantur, nodis protuberant articuli, maxime carpi, paulo minus tali, tument & extremitates costarum, ossa incurvantur, præcipue tibiæ & fibulæ, hinc ulnæ & radii, aliquando femoris & humeri, dentes tardè & molestè erumpunt, vacillant, nigrescunt, & frustulatim excidunt, pectus à lateribus angustum, antèrius acuminatum, abdominis repletio, & hypochondriorum tensio, tussis & pulmonum vitia laceffunt, lateralis decubitûs modò dextri, modò sinistri aversatio.

R^x Fol. Absinth. Vulgar. centaur. minor. Marrub. Alb. chamædryos, Scordii, calamentb. vulg. Parthen. Saxifrag. pratens. hyper. Virg. aureæ, serpill. mentb. salv. Rutæ card. Benedict. Puleg. Abrotan. chamæmel. Tanacer. Lilior. convall. omnium rec. collect. & incis. an. M. j, axung. Porcin. ℥iiij. sèc. ovin. & Vin. claret. an. ℥ij. macerentur in olla fictili super cineros calidos per horas xij. deinde ebulliant ad humiditatis consumptionem, & postea colentur, ut f. Linimentum, quo venter & hypochondria illinantur manè & serò, ut etiam & artus hoc malo affecti, per 30 vel 40 dies, vel donec convaluerit.

Ex Singulor. ingredient. prescript. an. Mij.
 infundantur frigide in Cerevisia non Lupu-
 lat. Cong. iij. pro potu.

In Tumoribus Infantum ventres occupan-
 tibus ab Evacuationibus nimis proceden-
 tibus.

Sanguis & Viscera herbis corroboranti-
 bus confortentur, ut in Rachitide vera; nisi
 quod axillæ etiam utraq; inungantur, at
 non artus.

De Febris à Dentitione Ortis.

*Sp. C. C. gutt. ij, vel iij, vel iv. pro ra-
 tione ætatis in Coch. j, vel altero Aq. Ce-
 rasor. nigr. vel Julap. alterius appropriati,
 exhibeantur quarta quæque hora ad vires
 quatuor, vel sex.*

De Febre hectica Infantum.

Sine insigni calore languent cum appeti-
 tus dejectione, artus & truncus corporis ema-
 ciantur.

*Rhabarb. incisi ℥ij. in lagenam vitream
 cerevisia tenuis ℥ij. capacem immittantur pro
 potu ordinario.*

Epoto hoc liquore, *aliæ thj, eidem Rhabarb. superaffundantur ad tertiam vicem.*

Si verò potus vi Catharticâ saturatiùs impregnetur, tum thj. epotâ alteri cerevisia mox adjiciatur.

De Tussi Puerorum Convulsiva.

Phlebotomiâ, & repetitâ Catharsi, eâque solâ, expugnatur hæc tussis, malum aliàs pertinacissimum, & fere insuperabile; sed leniora tantum cathartica his conveniunt, eaque, cochleatim ingerenda sunt, pro ratione ætatis.

De Hemorrhagia Narium.

Dolor & calor sinciput lancinant.

Sanguis è brachio frequenter extrahatur; victus ratio refrigerans & incrassans iungatur; Julap. refriger. & incrassans, Cum Emulsionib. refrigerantib. præscribantur.

Singulis diebus injiciatur *Enema refrigerans*, atq; omni nocte *Paregoric. ex Syrup. de Mecon.* exhibeatur & semel vel bis *potio purgativa commun.* præscribatur.

Lintea quadruplicata immersa Aq. frigide, in qua sal Prunell. dissolvatur, & postea leviter expressa admoveuntur nuchæ, & utrinq; cervici sæpius in die.

Post

Post Evacuationes liquor seq. applicetur.

R^x Vitriol. Hungaric. & Alum. an. ʒi. Phlegmat. Vitriol. ℥ss. Coq. tamdiu, donec omnia fuerint dissoluta, liquorem frigesactum filtra, & à Crystallis subinde natis separa, liquori residuo adde Ol. Vitrioli duodecimam partem ; vel potiùs.

R^x Aq. Plantag. ʒiij. Bol. Armen. subtiliss. pulver. ʒss. probè misceantur ; Turunda ex linteo raso liquore hoc humectata nari, ex quo sanguis stillat, indatur per dies duos istic relinquenda.

Hoc minus succedente, Vitriol. Rom. Aq. commun. dissolvatur, qua Turunda imbuta nari indatur, liquore etiam hoc linteamina imbuta, & applicata sanguinem sistunt si ex parte externa diffuat.

De Chlorosi.

Ad sunt vultus & totius corporis decoloratio, intumescencia in facie, palpebris & malleolis, gravitas totius corporis, crurum ac pedum tensiva lassitudo, respiratio difficilis, cordis palpitatio, capitis dolor, pulsus febrilis, somnolentia, pica & mensium suppressio.

Sumat

Sumat Pilulas Chalybeatas, vel Pulv. Chalybeatum in affectione hysterica præscript. plus minus pro ratione ætatis, superbibend. haustum vini cujuslibet ad libitum, vel infusion. corroborant. cum Rad. Angelic. ibidem describam. Si *Ægra* non valde debilis fuerit, purgetur semel vel bis ante præscriptorum usum.

De Suppressione Mensium.

Cibum fastidiunt mulierculæ, foedus faciei color est, gravitas totius corporis dolores sincipitis, lumborum, crurum & imi ventris; pedum tumores infestant.

Eadem præscribenda ac in Hysterica affectione; at si iisdem remediis affectus non cesserit, tum seq. sunt præscribenda.

Singulis Auroris, & quartâ pomeridianâ, sumat *Fulap. Hysteric. sine Castor. Coch. v. instilland. Sp. C. C. gutt. xij.* Singulis noctibus sumat cubitum itura *Trochisc. de Myrrh. ʒj. cum Syr. de Artemis. in formam boli vel Pil. Redact.*

De Vomitu sanguinis, vel etiam de Hæmoptoe.

In Hæmoptoë dolor & calor pectus obsident, cum debilitate quadam.

Mittatur

Mittatur sanguis ex brachio dextro ad 3x.
Sequenti mane sumat *portionem purgativ.*
commun. & eadem nocte *Paregoric. ex 3ij.*
Aq. Cerasor. nigr. & Syr. de Mecon. 3i.

Postea aggrediatur usum sequent.

Rx *Bol. Armen. 3i. Pulv. Radic. Symphit.*
3ij, Terr. Sigillat. Lapid. hamarit. & Sang.
Dracon. an. 3j, Sacchar. Albiss. ad pondus
omnium ; M. f. Pulvis subtilissimus, cujus
cap. 3j, manè quintâ pomeridianâ, & nocte,
superbibend. sequent. Apozemat. 3iv.

Rx *Fol. Plantag. Rubi Sylvestris, & mil-*
lesfol. an. M. j. coq. f. q. Aq. ad Miss, in
Colatura dissolv. Syrup. de Symphyt. 3ij ;
M. f. Apozema ; vel cap. Cochl. vj. sequent.
Tinctura.

Rx *Flor. Ros. rubr. 3vj, Cort. intern.*
querc. 3ss. sem. Plantag. parùm contus. 3iij,
Aq. font. 3ij, Sp. Vitriol. q. s. ad levem aci-
ditatem, infundantur in vase clauso, calore
leni, per 4 horas ; Colatur. adde Aq. cinnam.
Hordeat. 3iij. Sacchar. Albiss. q. s. ut f. Tin-
ctura gustui grata.

Si ab usu Pulveris abhorreat, utatur E-
lectuario in fluxu mensium immodico præ-
scripto.

Enema quotidie injiciatur, & Diacodium
horâ somni propinecur.

Phle-

Phlebotomia insuper semel, bis, vel ter (ut opus fuerit) reiteretur, diebus aliquot interpositis; & semel iterum, si res postuler, reperatur potio purgativa.

Diæta incrassans & refrigerans observanda.

De Punctura Tendinū.

Humor aqueus, vel ichor quidam, ex orificio venæ incisæ jugiter destillat.

℞ Rad. Lilior. alb. in lacte vaccin. ad teneritud. coct. & contus. ꝑiv, farin. sem. Lin. & Avenac. an. ꝑij. coq. ad cataplasmat. consistentiam in eodem lacte, quo radices coctæ fuere, applicetur parti affectæ manè & serò.

De Ambustis.

Foveatur pars affecta lintea Sp. Vini imbutis, usque dum evanescat dolor, ac deinceps de novo imbuatur linteam, quod ter vel quater in die parti affectæ applicetur.

De

De Mania communi.

A nimis exaltata & vivida sanguinis crasi oritur. Est & alia maniae species febres intermittentes diuturniores excipiens, in stultitiam tandem degenerans, producta quidem à debilitate & vappiditate sanguinis, à diuturna fermentatione. Præscribantur itaque cardiaca generosiora, viz. *Theriac. Andromach. Electuar. de ovo, Pulv. Comitiss. Pulv. Gualt. Rawleigh, in Aq. epidem. theriacal. vel aliâ*; & diæta instituatur analeptica.

In junioribus mittatur sanguis è brachio ad *ʒviij*, vel *ix*, bis vel ter, diebus tribus inter singulas Venæsectiones Interpositis. Tum semel extrahatur sanguis è venis jugularibus. Postea tota curatio innitatur sequenti Cathartico, quod sumat tertiâ vel quartâ quâq; die, donec convaluerit, hoc interim observando, quod cum octies vel decies purgatus fuerit æger, exhibitio Cathartici ad septimanam unam vel alteram omittatur.

Rx Pharmac. domestic. (i. e. Rad. Bryon. alb.) pulv. ʒj. lactis vaccin. ʒiv. vel,

Rx *Ejusdem* ℥ss, vel ℥vj, *Vin. alb.* ℥iv. *infundantur per noctem, in colatura dissolve Syr. Violar.* ℥i, *M. f. Potio* ; vel,

Rx *Gambugii* gr. xiv, *Aq. Cerasor. nigr.* ℥iij, *Syr. Caryophyll.* ℥ss, *f. Potio.*

De Contusionibus.

Mittatur sanguis è brachio lateris magis affecti ad ℥x, scq. mane exhibeatur *potio communis purgativ.* ac deinceps eodem modo *Venæsectio & purgatio alternatim repetantur, donec æger convaluerit.* Interim toto decursu, si interius partes lædantur, sequentia præscribantur.

Rx *Decoct. Pectoral.* ℥ss, *Syr. Violar. cap. Ven. an.* ℥ij ; *f. Apozema* ; *cap. ℥ss,* ter in die. Item *Ol. Amygd. dulc. rec. Cochl. j,* sæpius propinetur.

Rx *Ol. Amygd. dulc. unguent. Dialth. & Pomat. an.* ℥i ; *M. f. Linimentum,* quo *ungatur pars læsa manè & serò, superimponend. fol. Brassicæ.*

De furfure, five porrigne capitii.

Potio purgans communis bis propinetur, dein.

Rx Ol. Amygd. Amarar. ℥ Laurini, Cinerum fol. Abrotani an. ℥i, misceantur probe, ℥ f. Linimentum, quo inungatur totum caput singulis matutinis, diligenter infricando, & postea superimponendo vesicam suillam.

At primum abradatur totum capillitium, & postea defricentur squammulae sensim singulis auroris, prout decidere pronae fuerint,

De Morsu canis Rabidi.

Post 40 dies aut plures melancholica adfunt symptomata, febris, sitis, hydrophobia, & tandem partium extremarum convulsio.

Rx Sp. vin. optimè rectificat. ℥iv. Theriac. Andromach. ℥i, f. mixtura, qua illinatur pars laesa ter in die, superimponendo linteum eadem mixturâ imbutum.

De Ulcere Vesicæ.

Pus graveolens, aut sanguis nonnunquam squammulæ seu pelliculæ membranacæ ac veluti fursuracæ crustulæ (fin in renibus hæreat ulcus, carunculæ minutulæ, aliquando crassiores) unà cum urina excernuntur, perpetua dysuria & continuus earum partium dolor infestant; renibus autem affectis ulcere, dilucida dysuriæ & doloris dantur intervalla, pus etiam excretum copiosius est, album, leve & minimè foetidum, lacti similis profunditur urina: & longè post mictionem pus ab eo separatum in fundo resider.

Rx Emplast. Flor. unguent. dict. Ziß; f. Pil. N° ix; cap. iij, horis medicinalibus, superbibendo sequentis Aq. Cochl. vj.

Rx Rad. Fœnicul. Consol. Aristoloch. & Caryophyll. an. ziiij, fol. Agrimon. Hyper. Bugul. Sanicul. Plantag. an. M. vj, incidantur minutim, & destillentur in vini alb. & lact. an. ℥iv, & eliciantur solummodo ℥iv. pro usu.

Rx Pulv. Rad. Consolid. maj. & gumm. Arabic. an. zi, Sacchar. Penid. zij; f. Pulv. cap. Cochl. j, bis in die.

De Asthmate inveterato in iis, qui sanguineo temperamento præditi sunt.

Dividitur in tres species; Dyspnœam, quæ difficilis est respiratio, in qua crebrior densiorque est spiritûs tractio ex infarctu pulmonum sine stertore oriunda: Asthma, ubi frequens & magna respiratio, in qua diaphragma, musculi intercostales, tum etiam abdominis, violenter, moventur, cum stertore & sibilo. In priore specie substantia pulmonum, in posteriore bronchia oppilantur: Et Orthopnœam, quæ est maxima spirandi difficultas, sub qua ægrotantes non nisi sedentes, & erectâ, cervice respirare possunt. Musculi etiam pectoris & scapularum vehementer exagitantur.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad 3x. Die sequenti sumat *portionem purgativam communem*, quæ repetatur tertiâ quâque die per duas alias vices.

Diebus à Purgatione vacuis sumat sequentia.

Rx *Sem. Anis. subtiliss. pulv. 3ij. cum f. q. Balsam. Lucatell. f. pil. ex singulis drachmis vj. cap. iij. manè & quintâ pomeridianâ, superbibendi decocti Amari sine purgantibus 3iv. calidè.*

Si Symptomata adhuc maneant, repetatur de novo integer Processus.

De paralyfi.

Sensus & morus in partibus quæ afficiuntur, vel simul, vel alterutra tantum facultas aut prorsus extinguitur aut vitatur.

Sumat *pil. Coch. min. ℥ij.* alternis matutinis per *vj.* vices; deinde capiat ter in die per *xxx.* dies *Electuar. Antiscorbutic. ℥ij.* superbibend. *Aq. Antiscorbutic. Coch. vi.* Vide in scorbuto.

Rx Unguent. Nervin. ℥iii. *Sp. Lavendul. comp. ℥.* *Sp. Coch. hortens. an. ℥iss.* *M. & inungantur partes affectæ, ut spina dorsi, &c. manè & serò.*

Pleraque præscriptorum, utut curationi scorbuti solum destinari videantur; attamen cum humores crudos ac fixos volatilifare præ aliis apta nata sunt, in Paralyfi etiam conveniunt.

De tussi & Phthisi.

Tussis per se patet. Phthisis autem invadit ab ætatis anno 18 ad 35. Extenuatur totum corpus. Febris molestat hectica, à cibo invalescens (quæ ex celeritate pulsus, rubedinèq; genarum dignoscitur) materia per
tussim

tussim excreta cruenta est aut purulenta, in ignem coniecta terrum spirat odorem, & immissa in vas aquâ repletum, fundum petit. Sudores nocturni superveniunt, livescunt tandem genæ, facies pallet, exacuantur nares; temporum quoque collapsus, unguium incurvatio, capillorum defluxio, & alvi profluvium colliquativum, mortem statim subsecuturam denunciant.

Si Tussis recens fuerit, & nondum febrim, aut alia signa Peripneumoniam notham comitantia, accersiverit, vel si à Pleuritide, aut Peripneumoniâ, ob neglectam sufficientem Phlebotomiam, malè curatis eadem nequaquam orta fuerit, satis erit, ut æger per dies aliquot ab usu vini & carnis abstineat, & his similibus remedijs ad libitum utatur.

Balsamum sulphuris Anisatum ad gutt. x. Cochl. i, Sacchar. crystall. instillatum bis vel ter in die devoretur; ut etiam Tabellar. sequent. quas secum æger continuò portet, unam frequenter assumat.

Rx Sacchar. cand. ℞iſs, coq. s. q. Aq. font. usque dum adhiereſcat, extremis digitor. tum adde pulv. Glycyrrhizæ, Enul. Campan. sem. Anis. & Angelic. an. ʒſs, pulv. Irid. Florentin. Sulphur. an. ʒij, Ol. Chym. Anisi ʒij; f. s. a. Tabellæ domesticæ vocand. atque hoc interim Eclegmate utatur.

R^x Ol. Amygd. dulc. ℥ij, Syr. cap. Ven. Violac. an. ℥i, Sacchar. cand. q. s. f. Lohach. de quo sæpius lambat bacillo Glycyrrhizæ, quando tussis urget.

In defluxione tenui *Eclegmata incrassantia* exhiberi poterint.

Sin verò Tussis his remediis haud cessaret (præcipuè autem si febrim comirem habeat, vel si à Peripneumonia aut Pleuritide originem ducat) tum ineptum fuerit pectoralibus fidere; sed Venæsectione & Cathar- si debellanda est, ut in methodo, quæ in curatione Peripneumoniæ nothæ describitur.

Verùmenimverò cùm, his omnibus non obstantibus, Tussis non modò non curationi cesserit, sed & diurnâ Pulmonum concussione eos adeò debilitaverit, ut Phthisis tandem subingressa fuerit, tum hâc methodo procedendum.

R^x Balsam. peruv. gutt. x, instillantur Cochl. j, Syr. Hederæ terrestris, vel si id minus gratum fuerit ægro, Cochl. j, Sacchar. crystall. cap. ter in die superbibendo Decocti Amari sine purgantib. ℥iv, vel (si idem ventrem moverit) ℥ij.

Sed

Sed omnibus aliis (quotquot adhuc inventa sunt) *Equitatio* ad satis longa & diutina itinera facile palmam præripit, hoc observando, ut si æger juvenilem ætatem prætergressus fuerit, plus temporis huic exercitio impendere debet, quàm si puer aut juvenis esset, & sanè haud multò certius *Cortex Peruv.* febris intermittenti, quàm in hac ætate *Equitatio Phthisi* medetur.

De Scorbuto.

Adsunt spontaneæ lassitudines, corporis gravitas, dyspnœa, præcipuè ex motu corporis, gingivarum putrefactio, oris graveolentia, sanguinis è naribus crebra eruptio, ambulandi difficultas, crurum nunc intumescencia nunc extenuatio, in iisdem perpetuo maculæ lividæ, plumbeæ, flavæ, aut violaceæ, faciei color plerumq; ex pallido fuscus.

Extrahatur sanguis è brachio ad *℥viij*, nisi signa *Hydropis* adfuerint : Seq. mane exhibeatur *Potio Purgat. communis*, quæ repetatur tertiâ quâq; die per duas alias vices.

Diebus à purgatione vacuis, uti etiam postea, per mensem unum vel alterum sumat sequentia.

℞ *Conserv. Cochl. hortens. ʒij, Conserv. Lujul. ʒi, pulv. Ari compos. ʒvj. cum s. q. Syr. Aurantior. f. Electuar. de quo cap. ad magnitud. nuc. moschat. maj. mandè, quinquā pomeridianā, & nocte. superbibendo Aq. Raphan. compos. Cochl. vj. vel sequentis.*

℞ *Rad. Raphan. Rustican. raspat. ℥ij, rad. Ari ℥j. fol. Cochl. hort. M xij. fol. Mentb. Salv. Nasturt. aquat. ℥ Beccabung. an. M vj. Sem. Cochl. hort. parum contus. ℥ʒ. nuc. Moschat. ʒʒ Vin. Alb. ℥xij. destillentur organis communib. ℥ eliciantur solummodo ℥vj. pro usu.*

Vel Folia Rec. Cochl. hortens. per se destillentur pro usu dicto.

Porro sequens cerevisia sit pro potu ordinario.

℞ *Rad. Raphan. Rustican. recentis incisi ʒij. fol. Cochl. hort. N° xij. passular. enuclear. N° vj. Aurant. cum toto incisi dimidium, in Lagenam vitream ℥ij. Cerevisiæ tenuis capacitatem subere mox probe obturandam immittantur.*

In hunc modum parentur eodem tempore sex Lagenæ pro usu, & post aliquot dies sex aliae, antequam priores exhauriantur, & sic deinceps; vel,

Vice hujus Cerevisiæ seq. mixturæ Cochl. ʒij, vel iv. immisceri poterint singulis haultibus potus communis.

℞ Rad. Raphan. Rustican. ℥ sem. Cochl. hortens. an. ʒβ. fol. Cochl. hortens. M. ij. pul-
pam unius Aurant. Contundantur simul in mor-
tar. marm. sensim affundendo vin. alb. tʒβ. Co-
letur cum levi expressione, & reponatur pro usu.

Eadem remedia, Phlebotomiâ & Catharsi
omissis, in Rheumatismo scorbutico, sive Hy-
sterico, valde prosunt.

Tabis Descriptio & Cura.

Plures sunt Tabis species : Prima ferè ori-
tur è frigore hyeme contracto. Paulo enim
ante solititium Brumale quamplurimi ab in-
griente tempestate frigidâ, tussi tentantur :
Quæ cum illos invaserit quibus pulmones ab-
ortu sunt infirmiores, omnino necesse est ut à
repetitis Tussiendi conatibus magis adhuc de-
bilitentur ; atq; ita tandem alimento sibi
proprio assimilando, præ mala διαθήσει,
prorsus impares reddantur. Hinc jam ingens
Pituitæ crudæ copia aggeritur, quæ continuâ
pulmonum agitatione & vehementi nisu affa-
tim per os rejicitur. Pulmones exinde pure
referti purulenta *μάσματα* quaquaversum in
carnes dispergunt. Hinc enascitur Febris pu-
trida, cujus Paroxysmus sub vesperam fatigat
sub auroram vero sudore copioso ac vires
imminuente solvitur. Denique ad malorum
cumulum Diarrhœa succedit, parim ab hu-
moribus putridis ex arteriis Mesentericis in-
te-

intestina depositis excretisque, partim à labefactato pessundatq; viscerum Tono. Atq; ita demum æger proximâ ætate fato suo fungitur, à morbo cui prægressa Hyems viam straverat, extinctus. Atq; hæc est præcipua Tabis species.

Porro cùm sanguis hac tempestate particulis humidis admodum scateat, perspiratioq; à subitâ pororum contractione plus satis inhibeatur, particulae hæ in pulmones depluunt per interspersos Venæ Arteriosæ ramos; vel per Ductus Salivales in glandulis fauces occupantibus reponuntur; unde iam humor per Asperam Arteriam delapsus in pulmones, Catarrhi ritu, eos ita jugiter irritat, ut creber & vehemens tussendi conatus, tum illam debilitatem, tum alia quæ diximus symptomata, brevi accersat. Cuiq; non iam amplius naturalem sibi pulmones œconomiam statumq; tueri valeant, Glandulae & Tubercula adnasci solent; quæ in agris ex hoc morbo decedentibus, si aspiciantur pulmones, purulentâ sanie ut plurimum distenta reperiuntur.

Ubi semel invaluerit hic morbus & radices egerit, remedia plerumque aspernatur. Tentari utcunq; potest Medicatio, minuendo causam defluxionis in pulmones, pertusâ in Cubi o Venâ, Catharticis mitioribus; tum medicamentis pectoralibus dictis, ad varios morbi status accommodatis, Incrassantibus scilicet, humor subtilior & tenuior vim Expultri-

cis facultatis videtur eludere : Attenuantibus vero ubi pituita crassior ægre & cum molestiâ per os rejicitur. Dein & hectica Febris remediis refrigerantibus contemperantibusq; coerenda. Talia sunt *Lac Asininum, Aqua Lactis Stillatitia, Emulsiones ex Amygd. du'c. Sem. Melon. Pepon. Papav. alb. Aq. Fl. Paralyf. &c.* Deniq; & curando Ulceri opera danda est; cui rei Terebinthina illa Liquida, Opobalsamum vulgo dicta, apprimè conferre censetur.

Hujusce Morbi Curatio me Judice hâc methodo optimè ac felicissimè instituetur. Primum educatur è brachio sanguis dein subducatur Alvus ad tres dies continuos, vel *Pil. Coch. majoribus*, vel *Decocto Leniente*, à nobis præscripto. Tertiâ nocte exhibeatur *Syr. de Mec. ʒss.* Intermissò biduo, triduoq; pro re natâ repetatur Purgatio, idq; toties fiat quoties opus esse videatur, donec symptomata vel prorsus evanuerint vel saltem mitescant. Post singulas CatharSES jam finitas capiat Opobalsami gutt. xx. Sacchari particulæ majori instillatas permixtasq; nihil superbibendo. Vel *Pil. de Terebinth.* ex Insula Chio cum Saccharo cando confectam. Opobalsamum non assumendum est nisi prægressis evacuationibus debitis. Huius loco *Electuarium è Balsamo Lucatelli, Glycyrrb. pulvere, semine Anisi & Terebinthina concinnatum* poterit substitui. Post evacuationes sedulo conandum est ut Tussis sedetur, ne Pulmones jugi agitatione infirmiores evadant.

dant. Huc facit præ cæteris Syrupus jam laudatus, qui hac formula possit usurpari, *R. Decoct. Pectoral. ℥j. Syr. de Mecon. Syrup. Capill. Ven. an. ʒij. Cap. Cochl. v. ter in die.* Medicamentum hoc ita frequenter haustum catarrhum in Pulmones depluentem paulatim sistet; eosq; in pristinam *εὐερίαν* reducet nisi jampridem à naturali statu nimium recesserint. Promovebit insuper purulentæ materiæ in iisdem aggestæ concoctionem.

At vero Palmarium hujusce Morbi præsidium est, ut *Æger* quotidie Equo vebatur. Et qui se huic corporis exercitio sanandum tradit nullis jam Diætæ legibus adstrictus, nullo Cibi potusve genere privandus est: cum in hoc uno omnis rei cardo vertatur. Quibusdam eorum qui ex hac methodo convalescere tumor in collo exortus est non multum à Scrophulis abluens.

Est & alia Tabis species à Tussi prognata, longè diverso anni tempore, initio sc. æstatis. Hæc Juvenes persæpe illos invadit qui debiliore sunt corporis habitu, & quorum sanguis particulis calidis acribusque refertus est. Sanguinem isti de pulmonibus pertussim exantlant, nimio meri potu prius excalefacti. *Ægri* dolorem sive ægritudinem quandam in pulmonibus perferunt: Quæ Symptomata nisi maturè remediis appropriatis eliminantur primo scabrities, mox & ulcus accedit, unde pus confectum demum expuitur.

Dicta jam Tabis species Venæsectione & Catharsi bis alternatim repetitis, saltem in principio, facile vincetur : Si Diætâ insuper Refrigerante & Incrassante utatur æger & à carnibus in solidum abstineat.

Tertia huius Morbi Species ortum debet materiæ Febrili in pulmones Febre jam fatiscente, amandata; qui sensim infirmiores redditæ à symptomatis jam memoratis vexantur.

Quandoq; oritur à sanie istâ purulentâ quæ à Pleuriticis non satis copiosè per expectorationem egeritur. Quo in casu eandem quam Empyema, Curationem postulat.

Sunt etiam qui à nimis copiosis, & debito frequentioribus evacuationibus debilitati in quartam Tabis speciem præcipitantur. Hos calor Hecticus à Cibo poruq; sumpto, sub noctem laceffit : Atq; hos præ cæteris Aphthæ infestant.

De Podagra.

Exeunte Januario. aut incipiente Februario ingruir horâ serè secundâ matutinâ, dolore pollicem pedis ut plurimum occupante, quandoq; vero calcaneum, suram; aut talum, mox sequitur rigor cum horrore, & febricitatione aliquali, dolor gradatim intenditur, (& pari passu rigor atq; horror recedunt) idq; in singulas horas, donec tandem sub noctem ad apicem pervenerit, nunc tensionem violentam, nunc morsum canis rodentis, quandoq; pressuram,

ram, & coarctationem exprimens, hinc præ ex-
 quisito dolore, nec linteorum superincumben-
 tium pondus, nec cubiculi à fortiori ambulatione
 concussionem ferre Podagricus valeat; dolor non
 sedatur, nisi ante horam secundam, tertiamve
 matutinam, (decurso scilicet nycthemeri spatio à
 primo appulsu) & jam lenim dolore perfusus æger
 somno concedit, à quo evigilans, dolore multum
 immutato, partem affectam tumore recenter
 occupatam cernit. Sequenti die, fortè etiam ad
 biduum, triduumve dolet nonnihil pars affecta,
 idq; vehementius ad vesperscente die, levatur
 autem sub galli cantu. Intra paucos dies alter
 Pes eodem dolore torquetur. Postquam utrumq;
 pedem exercuerit dolor, qui sequuntur Paroxysmi
 abnormes sunt, tum quoad tempus invasionis,
 tum durationem; atq; ex serie horum paroxys-
 mulorum, constat paroxysmus, qui dicitur
 Podagræ diuturnior breviorve pro ægri ætate
 in iis qui vegetiores sunt & quos Podagra
 rarius invasit, diebus sæpe quatuordecim, in
 senioribus, atque iis quos sæpius afflixit,
 duobus mensibus ferè definit, iis verò, qui
 vel annis, vel diuturniore morbi mora
 fracti sunt, non prius valedicit, quàm ætas
 jam adultior eam fugaverit.

Ad quatuordecim Primos dies urina
 coloratior est, cum sedimento rubro, & quasi
 arenulis referro, alvus ferè constipata est. *Appetitus*
 prostratio, rigor totius corporis sub
 vespere, integrum Paroxysmum comitantur,

re-

recedentem Paroxysmum excipit pedis affectus inter digitos pruritus vix ferendus, unde decidunt furfures, & pedes desquamantur.

Hactenus dolor pedibus tantum fuerit infestus, cum verò vel ab indebita medicatione turbatur Podagra, vel ob diuturnam morbi pertinaciam, corporis substantia quasi in morbi fomitem pervertitur, jam manus, carpos, cubitos, genua, aliasq; regiones occupat, quandoq; unum, pluresve digitos distorquens, fasciculo radicum pastinacæ similes eos reddit, motu paulatim privans, tandemq; concretiones, circa articulum, ligamenta, tophaceas generans, ocreas, vel oculos canctorum æmulantes; nonnunquam in cubitis tumorem subalbum ciet, ferè ad ovi magnitudinem, qui sensim inflammatur cum rubore, nonnunquam femur occupans, sensum exhibet, quasi ingentis ponderis appensi, sine dolore tamen notabili, at genu exinde petens, id acius urget, artus jam habet æger ferè undequaq; contractos, & impeditos, ita ut claudicet, & permolestè prorepit. Urina illam colore imitatur, quæ in diabete excernitur, dorsum aliæq; partes molestè pruriunt, maximè sub horam somni.

Post multos, ditiosq; cruciatus Paroxysmi subsequentes (naturâ partim onere materiae peccantis partim senio oppressâ) ægrum quoad dolorem clementius tractant, at loco doloris consueti, ægritudo quædam cum dolore ventris, lassitudo spontanea, quandoq; etiam propensio

penſio ad diarrhoeam ſuperveniunt, quæ ſymptomata evaneſcunt, quoties articulos dolor fatigat, atq; ita nunc dolore, nunc ægritudine, quaſi alternatim laceſſentibus, Paroxyſmus longas moras neſcit.

Calculus Renum in quamplurimis parit hic affectus.

Fœminas perraro infeſtat, eaſque, non niſi jam vetulas, & viragines, pueros quoque, & juvenibus minores vix adoritur.

Indicatio Curativa in eo vertitur, ut coctioni conſulatur, indigeſtionibus ſublatis, ſeu fit per *Pharmaca*, ſeu victûs rationem, ſeu exercitationem, ſeu alia ex liſtis quælibet, quæ ſex res non-naturales indignantur.

Venæſectio, Cathariſis, ac Diaphoreſis ſcopum non attingent, licet iis qui *Renum* ſimul *Calculo*, & exindè orto *Mictu ſanguineo* laborant, non abs re erit, ſemel in ſeptimana, alvum *Mammâ* ſubducere, & ſingulis noctibus, poſt Purgationem Paregoricum exhibere.

Medicamenta, quæ prædictæ indicationi ſatisfaciunt, ea ſunt, quæ moderatè calent, & vel amaricant, vel linguam leniter feriunt, talia ſunt, *Rad. Angelic. enulæ, fol. Abſinth. cent. min. cham cham.ep. ꝑc.* quibus addi poſſunt *Antiſcorbutica* dicta, ut, *Rad. raph. ruſtic. fol. Cochl. hort. naſturt. Aq. ꝑc.* quæ tamen parcius uſurpanda veniunt, quia morbi fomiti aculeps ſubdunt, & calorem augent, præ iſtis aliis quæ miti calore, atq; amaritudine, ventriculum corroborant. Haud inutile eſt *Electuar.* ſequens.

Rx Con-

R̄ *Conserv. cochl. hort. ʒiʒ, Absinth. rom flav. Aurant. an. ʒi, Angel. condit. nuc. mosch. cond. an. ʒʒ. Theriac. Androm. ʒiij. Pulv. ari comp. ʒij. cum s. q. Syr. Aurant. f. Elect. de quo sumat. ʒij. bis in die superbibendo seq. Aq. destillat. Cochl. v. vel vj.*

R̄ *Rad. raphan. rustic. incis. ʒiij, Cochl. hort. M. xij. naslurt. Aq. becabung. sal. v. menth. an. Miv. cort. aurant. N° vj. nuc. mosch. cont. N° ij cerev. Brunsvicens. ʒxij. destillentur organis communibus, donec solummodo ʒvj. aquæ eliciantur pro usu.*

Hæc autem remedia *digestiva*, constanter, atq; omni adhibitâ diligentia, assidue usurpanda, & in *paroxysmorum* intervallis præcipue in usum revocanda sunt.

Mediocritas ea in cibo observanda est, ut neq; plus alimenti ingeratur, quam ventriculus concoquere valeat, neq; è contra nimia, abstinentia, partes eâ proportionem alimenti defraudentur, quæ earundem robur & vigorem sustinere potis est. Quoad qualitatem autem ciborum, ægri palato consulendum est, & unica ciborum specie singulis passibus vescatur, de cæteris, demptâ carne, prohibitu comedat, modo nec acria, nec sale condita sint, nec aromatis. Prandere tantum expedit, loco autem cœnæ indulgeat sibi haustum cerevisiæ alicujstenuioris, quo calculi concretio impediatur.

Liquores optimi sunt, qui neq; ad vini generositatem ascendunt, nec ad aquæ debilitatem, ne frigore suo lædant ventriculum, deprimuntur.

muntur. Huiusmodi est *Cerevisia tenuis Londinensis* aut multa aqua, cum pauco vino permixta, aqua autem pura & cruda periculosa est, cum autem universa ferè corporis substantia, in podagram degeneraverit, à liquore quocumq; fermentato quartumvis leni, & tenui abstineat, & utatur *Decocto Dietetico ex Sarsa*, in remedium formulis descripto, ubi primum à paroxysmo convalescit, per reliquum vitæ cursum.

Sin autem æger à longo, & nimio liquorum inebriantium usu, vel ab ætate proveciore, vel deniq; præ nimia debilitate, cibos absq; vino nequeat concipere, in paucis haustum vini Hispanici sibi indulgeat, *Apozema Dieteticum* abdicans.

Æger maximè hyemis tempore, maturè lectum petat, diluculo exurgat, animus sit tranquillus, nec nimis intentus studiis, & rebus seriis, cæteris vero omnibus, exercitatio corporis quotidiana, facile palmam præcipit, quæ moderata sit, & perseverans, nullo autem modo iusto vehementior; quoad exercitii genus, quoties nec grandior ætas, nec calculus intercedant, reliquis præferenda est equitatio constans, ac assidua in aere salubri, aut vectio in curru.

Veneris lenociniis ne indulgeat. Remedia externa nulla adhibenda.

Quamvis nihil magni in paroxysmo sentandum sit, conducet tamen fortasse per aliquot dies, ubi primum à morbo corripitur à carnibus abstinere iusculo uti avenaceo, aut alio pari alimento; si autem spiritus animales ataxiam concipere apti sunt, non expedit à carnibus abstinere diutius; quam ventriculus earum usum aversetur ne quid autem vel in quantitate, vel in qualitate ciborum aut potûs peccet.

Sym.

Symptomatis iis occurrendum est, à quibus æger in paroxysmo de vita periclitatur; horum maxime familiare est, ventriculi languor, cum ventris torminibus, tanquam à flutu, hoc in casu, nihil æq; vobis responderet, ac vini Canarenfis haustulus subindè deglutitus, exercitior utatur æger; si autem symptoma, inducias haud ferent, mortem minuetur, modo caput malum non impetat, ad *Laudan.* statim confugiendum, viz. *gut. xv.* in haustulo *Aq. Epidem.* & in lecto ad quietem se componat. hanc ipsâ methodo, se ab imminente morte liberavit auctor clarissimus ubi ex errore aliquo, circa res sex non-naturales, in ingentem ventriculi ægitudine incidit, cum vomituritione, & aliquali ventris dolore, artus interrim, ex retrocessione materiæ Podagricæ, doloris erant expertes, ac ad motum plus solito habiles, Congium nempe unum liquoris possatici, vel cerevisiæ tenuis devorabat, & quamprimum totum per vomitum rejecerit, Vini Canar. haustulum, cui instillatæ fuerint *Laudan. liq. gutt. xvij.* sumebat, quod si huic remedio symptoma non cedat, sudor provocetur, methodo & medicamentis huic usui dictis; ad bidaum, triduumve, manè & vespere per duas tresve horas continuas.

Si autem metastasis fuerit materiæ peccantis in Pulmonum lobos; liberatis artubus à dolore, & tumore, tractandum est hoc symptoma, pari modo ac Peripneumonia absoluta, venæsectione scilicet reperiâ, diætâ, & remediis, refrigerantibus, & incrassantibus, purgandus est insuper æger, inter venæsectiones, potionibus lenientibus, sudoris autem provocatio obest.